

## DIFERENCIAS

### A.PALUDICOLA

### A.SCHOENOBAENUS

Ala ♂ (58) 59-68 ♀ 56-66

Ala ♂ (60)64-72(73,5)[76?] ♀ [56?](59)61-68(70)

Fórmula alar: 2ªP= 3/4 ó = 4 (= 4/5)

Fórmula alar: 2ªP= 3/4 ó = 4 [= 4/5]

Cabeza de aspecto redondeado

Cabeza de aspecto en forma de cuña

Ceja ancha con final curvado hacia abajo

Ceja estrecha recta en forma de cuña

Lista ocular negra marcada y ancha tras el ojo

Lista ocular negra más estrecha tras el ojo

Bridas pálidas

Bridas oscuras

Pico más corto y de base más gruesa

Pico más estrecho y largo

Mandíbula inferior pálida

Mandíbula inferior más oscura

Frente color bronce

Frente marrón

Lista pileal beige, fina y muy definida

Lista pileal marrón, ancha y poco definida

Plumaje amarillento

Plumaje marrón claro(+ beige en Joven)

Jóv.pecho estriado o no y finas estrías en flancos

Jóv.pecho moteado, no estriado

Ad.flancos estriados

Ad.flancos lisos

Dorso estriado y beige amarillento(dos rieles)

Dorso marrón sin estriado

Obispillo estriado sobre fondo beige

Obispillo castaño liso o casi liso

Puntas de las RR en punta

Puntas de las RR redondeadas

Patatas rosa grisáceo o rosa carne

Patatas más oscuras



Adulto

Juvenil moteado

Juvenil sin motas



Adulto

Juvenil



Adulto



Adulto

A.paludicola



A.schoenobaenus