

Pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*). Subespecies y especies afines

Fringilla coelebs coelebs (♂ / ♀) Europa




Patrón de las rectrices (Ad / Juv)R4



Fringilla coelebs africana (♂ / ♀)



Patrón de las rectrices (Ad / Juv)R4




Fringilla coelebs bakeri (♂ / ♀) Gran Canaria



Fringilla coelebs canariensis (♂ / ♀) Tenerife, Gran Canaria y La Gomera



Patrón de las rectrices



Macho_EURING 6_La Gomera
Fringilla coelebs canariensis



Macho_EURING 6_Tenerife
Fringilla coelebs canariensis


Fringilla coelebs palmae (♂ / ♀) La Palma



Fringilla coelebs moreletti (♂) Azores



Fringilla coelebs maderensis (♂ / ♀) Madeira



Fringilla coelebs ombriosa (♂) El Hierro



Otras subespecies del Pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*):

***Fringilla coelebs baleárica* (♂ / ♀) Península Ibérica y Baleares**



***Fringilla coelebs gentilis* (♂ / ♀) Islas Británicas**



***Fringilla coelebs caucásica* (♂ / ♀) Balcanes, Grecia, Turquía, Irán**



***Fringilla coelebs syriaca* (♂) Chipre, Turquía, Irán y Jordán**



Subspecies:

❖ grupo *coelebs*

- *F. c. alexandrovi* Zarudny, 1916 – northern Iran
- *F. c. caucasica* Serebrovski, 1925 – Balkans and northern Greece to northern Turkey, central and eastern **Caucasus** and northwestern Iran
- *F. c. coelebs* Linnaeus, 1758 (**nominate subspecies**) – Eurasia, from **western Europe** and **Asia Minor** to **Siberia**
- *F. c. balearica* von Jordans, 1923 – **Iberian Peninsula** and the **Balearic Islands**
- *F. c. gengleri* O. Kleinschmidt, 1909 – British Isles
- *F. c. sarda* Rapine, 1925 – **Sardinia**
- *F. c. schiebeli* Erwin Stresemann, 1925 – southern Greece, **Crete** and western Turkey
- *F. c. solomkoi* Menzbier & Sushkin, 1913 – **Crimean Peninsula** and southwestern Caucasus
- *F. c. syriaca* J. M. Harrisson, 1945 – **Cyprus**, southeastern Turkey to northern Iran and Jordan
- *F. c. transcasplia* Zarudny, 1916 – northeastern Iran and southwestern Turkmenistan
- *F. c. tyrrhenica* Schiebel, 1910 – **Corsica**

❖ grupo *spondiogenys*

- *F. c. africana* J. Levaillant, 1850 – Morocco to northwestern Tunisia, northeastern Libya
- *F. c. spodiogenys* Bonaparte, 1841 – Eastern Tunisia and northwestern Libya: Atlas chaffinch

❖ grupo *canariensis*

- *F. c. canariensis* Vieillot, 1817 – central **Canary Islands** (La Gomera and **Tenerife** and **Gran Canaria**)
- *F. c. bakeri* Illera et al., 2018 – central Canary Islands (Gran Canaria)
- *F. c. maderensis* Sharpe, 1888 – Madeira: **Madeiran chaffinch**
- *F. c. moreletti* Pucheran, 1859 – Azores
- *F. c. ombriosa* Hartert, 1913 – El Hierro, Canary Islands
- *F. c. palmae* Tristram, 1889 – La Palma, Canary Islands: **La Palma chaffinch**

Especies afines:

Pinzón del Teide (Fringilla teydea) (♂ / ♀) Tenerife ‘especie’



Pinzón Azul de Gran Canaria (Fringilla polatzeki) (♂ / ♀) Gran Canaria ‘especie’



Referencias: 1. F.c.bakeri (Quercus_2019-400_12) 2. REVISTA DE ANILLAMIENTO N.º 35 • OTOÑO 2016 SEO/BIRDLIFE 3. https://es.wikipedia.org/wiki/Fringilla_coelebs & https://en.wikipedia.org/wiki/Common_chaffinch