

LOS LIMICOLAS INVERNANTES EN CEUTA

Autor: Antonio J. Cambelo Jiménez



En el presente artículo vamos a dar a conocer una serie de especies de aves invernantes o que se detienen durante un tiempo durante sus desplazamientos migratorios en las costas de Ceuta. Agrupamos a estas especies con el calificativo genérico de aves limícolas por el tipo de habitat en el que se reproducen y buscan el alimento.

Se alimentan en costas rocosas, estuarios de ríos, marismas o playas arenosas.



VUELVEPIEDRAS COMÚN (*Arenaria interpres*)

El vuelvepiedras común se distribuye, durante la época de reproducción, por áreas costeras en torno al Ártico de todo el hemisferio norte, alcanzando por el sur los países escandinavos. Es un migrador de larga distancia que llega a España procedente del norte de Europa.

El vuelvepiedras común se reproduce siempre en las inmediaciones de las costas continentales e insulares, en lugares dominados por frías tundras, donde soporta adversas condiciones meteorológicas.

Fuera de la época reproductora es casi completamente costero, aunque prefiere orillas pedregosas, rocosas o cubiertas de algas, además de estructuras artificiales, como rompeolas, puertos, embarcaderos y corrales para moluscos. Precisamente las costas rosas de la bahía norte de Ceuta son el habitat preferido para invernar en nuestras costas.

En la foto principal ave en plumaje estival, en recuadro librea invernal.



Fenología de Ceuta en ebird.org

© Andrés Martínez


ANDARRÍOS COMÚN (*Actitis hypoleucos*)

El andarriós chico se extiende por gran parte de Eurasia como reproductor, aunque se hace más raro y de distribución fragmentada hacia el sur. Parte de la población migra e inverna en el sur de Europa, Asia meridional, África y Oceanía.

Se distribuye por toda la península, supeditando su presencia a la de arroyos, ríos y embalses, por lo que resulta más frecuente en la mitad norte y en zonas de cierta altitud. Siendo más escaso en el sur y levante.



© Joaquín Sánchez Espinosa



Fenología de Ceuta en ebird.org

Cria de forma muy dispersa por ríos, arroyos y embalses de la Península, donde ocupa ensenadas, bancos arenosos y acumulaciones de grava. En migración e invernada puede aparecer también en estuarios, marismas, playas y áreas rocosas. Se alimenta de invertebrados (fundamentalmente insectos, tanto terrestres como voladores), que captura sobre la superficie del agua o en orillas fangosas.

En Ceuta, es un invernante escaso, observándose algunos ejemplares aislados tanto en la bahía sur como la norte.

CORRELIMOS TRIDÁCTILO (*Calidris alba*)

El correlimos tridáctilo es una especie que cría en torno al Ártico, en costas septentrionales de América, Groenlandia y norte de Asia. Es una de las aves que efectúa mayores desplazamientos en todo el planeta, ya que inverte en la zona meridional de Sudamérica, África del Sur y tropical e incluso Australia y Nueva Zelanda. También hay invernantes en Europa y en la cuenca mediterránea. Es una especie invernante en la Península, Baleares y Canarias, con un marcado paso migratorio y escasos veraneantes.

Se instala durante la época reproductora en altas latitudes de climas muy fríos, donde abundan terrenos cubiertos con céspedes, líquenes y musgo. Fuera de esa época se decanta por ocupar principalmente playas y, de forma marginal, salinas, lagunas y medios similares cercanos a la costa, así como aguas interiores.



Fenología de Ceuta en ebird.org

Se alimenta, esencialmente, de pequeños invertebrados. En época reproductora captura muchos insectos, sobre todo adultos y larvas de moscas, así como escarabajos, mariposas o arañas. También consume crustáceos y, en momentos de escasez, puede aprovechar materia vegetal.

El correlimos tridáctilo es una limícola de pequeño tamaño y de plumaje bastante pálido, al que se suele ver recorriendo las playas con una veloz carrera, mientras persigue a las pequeñas presas que arrastra el oleaje. En Ceuta, se han visto pequeños grupos en las playas arenosas.

ZARAPITO TRINADOR (*Numenius phaeopus*)

El zarapito trinador se reproduce en áreas septentrionales del hemisferio norte: en Norteamérica, Islandia, norte de Europa y norte de Asia. Durante la invernada se desplaza considerablemente al sur, pues llega a alcanzar los extremos meridionales de América, África, Asia y Oceanía. El paso posnupcial por la Península tiene lugar entre julio y septiembre y el prenupcial en abril y mayo. La partida de sus zonas de invernada en África se produce en marzo y los efectivos alcanzan Europa entre la segunda quincena de abril y los primeros días de mayo.



Fenología de Ceuta en ebird.org




El zarapito trinador cría, frecuentemente, cerca de la costa, pero no se encuentra estrictamente ligado al litoral, por lo que puede adentrarse en el interior y ocupar hábitats propicios (páramos húmedos, brezales e incluso terrenos arenosos) desde el nivel del mar hasta los 700 metros de altitud. En migración e invernada se manifiesta como un ave muy costera y aparece en marismas, zonas intermareales o estuarios.

En Ceuta tiene predilección por las zonas rocosas de la costa .

OSTRERO EUROASIÁTICO (*Haematopus ostralegus*)

El ostrero euroasiático se distribuye ampliamente por numerosas zonas templadas y subárticas de Europa y Asia. Se reproduce en Islandia, norte de Noruega, Finlandia y en torno al mar Negro. Una parte de la población europea es migradora y pasa el invierno en las costas meridionales del continente (incluida la Península Ibérica) y en el norte de África.

Nidifica en lugares diversos, como playas arenosas apenas visitadas por el hombre, estuarios, complejos dunares con escasa vegetación, isletas en marismas, salinas, islotes accesibles durante la bajamar, en el límite inferior de los acantilados e, incluso, en campos de cultivo.



Fenología de Ceuta en ebird.org



En áreas interiores consume, mayoritariamente, lombrices de tierra, gusanos e insectos adultos. En regiones costeras, sin embargo, ingiere una gran variedad de presas. Puede utilizar su pico para alimentarse en la oscuridad mediante el tacto, aunque también es lo suficientemente fuerte como para perforar las defensas de bivalvos y cangrejos. De igual manera, los ostreros utilizan este eficaz instrumento para sondear en el lodo en busca de gusanos y para despegar lapas y caracoles de las rocas.


En Ceuta se le puede ver esporádicamente.

CHORLITEJO GRANDE (*Charadrius hiaticula*)

Se distribuye como reproductora por altas latitudes del hemisferio norte, desde Norteamérica hasta Siberia. En Europa se localiza en las islas Británicas, el norte de Francia, Islandia, Escandinavia y las regiones bálticas, no se reproduce en España, aunque durante la invernada se puede considerar un ave relativamente común en las costas atlánticas y algo menos habitual en el litoral mediterráneo.

Los desplazamientos migratorios suelen realizarse por la costa, aunque también se han observado aves en localidades propicias del interior. El paso prenupcial se verifica entre abril y mayo, mientras que el posnupcial tiene lugar entre agosto y octubre, tanto en las costas atlánticas como en las mediterráneas.

En invierno y durante la migración tiende a concentrarse en amplias zonas arenosas, así como en playas con guijarros que cuenten con emplazamientos de descanso apropiados por encima de la línea de pleamar.



Fenología de Ceuta en ebird.org



En áreas de reproducción se alimenta de pequeños invertebrados terrestres y costeros, mientras que fuera de la estación reproductora suele incluir en su dieta gusanos poliquetos, crustáceos y moluscos. Para capturarlos localiza a las presas con la vista y, tras una corta carrera, las atrapa con el pico.