

¿QUE FUÉ DEL...ESCRIBANO MONTESINO EN CEUTA?

Autor: José Navarrete Pérez

INTRODUCCIÓN




El escribano montesino (*Emberiza cia*) es un pájaro de 16 cm. de longitud. Habita en laderas rocosas de colinas y montañas, barrancos, claros de bosques, zonas arbustivas, terrazas cultivadas y viñedos. Suele alcanzar gran altitud en zonas de piornales y otras formaciones de matorral de alta montaña con pinos bajos y dispersos. En invierno desciende hasta sotos fluviales, bosque abiertos y áreas cultivadas. Se alimenta principalmente de semillas de gramíneas, así como de yemas, brotes y frutos diversos. En primavera y verano incorpora a la dieta insectos y otros invertebrados. Está catalogado “en régimen de protección especial” siendo sus principales riesgos la intensificación agrícola y los plaguicidas (SEO/BirdLife).

Se distribuye por el sur de Eurasia y por el norte de África. La ssp. *cia*: es residente en el oeste y sur de Europa y en el norte de África. Principaentario (Copete 2020)

En la península tingitana es residente escaso con aporte de algún invernante, principalmente en zonas de alta montaña. En el Jbel Moussa es reproductor común. En Ceuta en la década de los 90 era residente escaso en la zona continental. No ha sido registrado en el monte Hacho (Navarrete et. al. 2024).

Gráfico nº 1.- número de anillamientos desde 1985 hasta 2025 y línea de tendencia



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Entre los años 1985 y 2025 (a.i.) se ha procedido al marcaje de 29 ejemplares capturados para su anillamiento científico en la zona continental de Ceuta. No ha habido capturas en el monte Hacho. La mayoría de estas capturas (24 ejemplares) se realizaron durante la primera decena de seguimiento (1985-1994). A partir de 1994 sólo se capturan cuatro ejemplares en los años 2005, 2015, 2016 y 2017 (uno en cada año). A partir de 2018 no se ha capturado ningún ejemplar (Gráfico nº 1). La tendencia es claramente negativa y presenta un declive acusado.

Desconocemos los motivos concretos que han causado este descenso en la pequeña población de Ceuta del escribano montesino, catalogada de “escasa” en los años 90 como se ha comentado, pero se pueden aventurar los siguientes: la desaparición de antiguas huertas (sobre todo en el arroyo de Calamocarro), los importantes incendios que se han venido produciendo en los últimos años y el cambio climático que ha alterado los habitats y la pluviosidad. En España, esta especie presenta un declive moderado tanto a largo plazo (1998-2023) como a corto plazo (2012-2023) (Scandell et al. 2023).

BIBLIOGRAFÍA

Copete, J.L., 2020. Rock Bunting (*Emberiza cia*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

Navarrete J., López J. y El Khamlichi R., 2024. *Las Aves de la Península Tingitana*. Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta.

SEO/BirdLife: seo.org/ave/escribano-montesino/

Scandell V., Herrando S. y Escudero E., 2023. En *Programas de Seguimiento y Grupos de Trabajo de SEO/BirdLife 2023*. pp.78-81. SEO/BirdLife. Madrid.