

BOLETÍN INFORMATIVO Y ANUARIO ORNITOLÓGICO 2025
JUNIO 2026

REVISTA ALCUDÓN

23



SUMARIO

EDITORIAL	2
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, CONOCIMIENTO Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE	
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, CONOCIMIENTO Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE	3-14
CITAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE 2025	15
ANILLAMIENTO, PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y ESTUDIOS	
CHAGRA DEL SENEGAL (<i>TCHAGRA SENEGALUS</i>)	17-19
¿QUE FUÉ DEL.....ESCRIBANO MONTESINO EN CEUTA?	20-21
LITORAL DE CEUTA. SALIDAS EN BARCO DURANTE EL PASO POSTNUCIAL	22-35
ANILLAMIENTO CIENTÍFICO DE AVES	36-39
MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE MARCAJE DE CERNICALO VULGAR (<i>FALCO TINNUNCULUS</i>) CON ANILLAS DE PVC EN CEUTA DURANTE EL AÑO 2025	40-43
INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE UN CERNÍCALO VULGAR (<i>FALCO TINNUNCULUS</i>) MARCADO CON UN DISPOSITIVO GSM EN 2025	44-45
LOS LIMÍCOLAS INVERNANTES EN CEUTA	46-53
RESCATE DE PARDELAS CENICIENTAS (<i>CALONECTRIS DIOMEDEA</i>) DURANTE SU MIGRACIÓN POSTNUPCIAL POR CEUTA	54-55
RESUMEN RESULTADOS RAM CEUTA 2025	56-59
RESULTADOS ANILLAMIENTO GAVIOTA DE AUDOUIN (<i>ICHTHYAETUS AUDOUINII</i>) EN CEUTA, AÑO 2025	60-63
RESULTADOS ANILLAMIENTO GAVIOTA PATIAMARILLA (<i>LARUS MICHAHELLIS</i>) EN CEUTA, AÑO 2025	64-67
NOTICIARIO ORNITOLÓGICO	
NOTICIARIO ORNITOLÓGICO	68-79
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL	
ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL	81-88
JILGUERO EUROPEO (<i>CARDUELIS CARDUELIS</i>). AVE DEL AÑO 2026	89
TEMPORADA 2025 DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AVES EN CEUTA	90-106
OTROS	
WEB AVES DE CEUTA: 18º AÑO EN LA RED	107
MAPA TOPOGRÁFICO DE CEUTA	108
REDACCIÓN, MAQUETACIÓN Y EDICIÓN: ANTONIO J. CAMBELO JIMÉNEZ	
REDACCIÓN, RECOPIACIÓN Y COORDINACIÓN: JOSÉ NAVARRETE PÉREZ	
PORTADA: CERNÍCALO VULGAR (<i>FALCO TINNUNCULUS</i>). AUTOR: JOAQUÍN SÁNCHEZ ESPINOSA	

Los contenidos publicados en esta revista, son solo responsabilidad de los autores de los artículos, por lo tanto la Ciudad de Ceuta y la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, no se hace responsable de las opiniones y contenidos de esta publicación.

EDITORIAL

NUEVOS AVANCES EN CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa (aunque muchas veces se nos pone a prueba la paciencia) avanzamos en nuestro objetivo: que se instaure una conciencia de protección de nuestro medio natural en la Administración y la sociedad ceutí.

Varios hechos lo demuestran, por un lado, la cada vez mayor participación de los ciudadanos en nuestras actividades, los centros educativos y todo tipo de asociaciones y colectivos que cada vez más, demandan la participación en nuestras acciones divulgativas, incluyéndolas como una materia más en sus calendarios formativos.

Otro aspecto es la presencia cada vez más frecuente en los medios de comunicación locales, que se hacen eco de nuestras denuncias, actividades, campañas, etc.

En el ámbito de la Administración local, parece que nos tienen más en cuenta, una de las pruebas, es que la Consejería de Medio Ambiente se ha comprometido a poner de nuevo en marcha en Consejo Sectorial de Medio Ambiente, un órgano creado hace años y que dormía el sueño de los justos debido al desinterés y apatía demostrada por los consejeros pretéritos.

El aumento de la subvención de Consejería a la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta, es otro indicativo que el trabajo realizado es reconocido, asimismo el compromiso de la misma de realizar una serie de reparaciones y obras de acondicionamiento en la Estación Ornitológica de Punta Blanca que sufría el deterioro del paso de los años y su cercanía al mar. Otro punto interesante es la cesión de un espacio de reunión en la Sirena de Punta Almina, recientemente restaurada, para que se puedan realizar actividades de los diferentes colectivos ornitológicos ceutíes, estos hechos avalan nuestra percepción de una mayor preocupación de la Administración Local.

Afortunadamente cada vez hay más ciudadanos que participan en las actividades, desgraciadamente esto no se traduce con que alguno de ellos se comprometan a entrar en los colectivos y tener más implicación en la organización y funcionamiento, esta situación conlleva una gran carga de trabajo en los pocos miembros que gestionan las actividades, impidiendo muchas veces que se puedan organizar más eventos.

En Ceuta, mientras las golondrinas comunes construyen su nido, por Antonio J. Cambelo Jiménez.



**ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y
CONOCIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE**

CHARLAS EN COLEGIOS, INSTITUTOS Y OTRAS INSTITUCIONES

Se han impartido charlas divulgativas y de educación medioambiental, sobre la temática de la migración, la relevancia ornitológica de Ceuta, **introducción a la observación de aves y utilización de aplicaciones como la guía de aves de España de SEO, eBird, Merlin y Avefy.**

El 9 de enero a los alumnos de 3ºA y 3ºB del Instituto Beatriz de Silva.

El 12 de febrero a los alumnos de **1º y 2º curso de FP básica de jardinería y 1º y 2º cursos de Técnico en Jardinería y Floristería (Grado Medio)** del Instituto Clara de Campoamor.

El 26 de febrero a los alumnos del módulo transversal de integración de la economía circular en gestión empresarial del **Programa Tamden, seguridad Informática: nicho de empleo para Ceuta** desarrollado por la Cámara de Comercio de Ceuta dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

El 10 de diciembre, en las instalaciones del **Programa Experiencial de Empleo y Formación - Los Geranios**, a los alumnos del taller de empleo de jardinería, sobre la relevancia ornitológica de Ceuta, iniciación a la observación de aves y el uso de varias aplicaciones relacionadas con las aves y las plantas.

A todos asistentes y se les hizo entrega de documentación y bibliografía para que puedan seguir profundizando en las materias impartidas.

II ENCUENTRO DE CORRESPONSALES JUVENILES CEUTA 2025

El 22 de febrero se impartieron unas charlas divulgativas en el Complejo Miguel de Luque en el marco del **Encuentro de corresponsales juveniles**, organizado por la Casa de la Juventud de Ceuta. Se dio una charla sobre la introducción de aves y sobre la utilización de aplicaciones como la guía de aves de España de SEO, eBird, Merlin y Avefy. Posteriormente, se estableció un coloquio en el que los asistentes realizaron preguntas para profundizar en el conocimiento de las aves de Ceuta y se realizó un recorrido por los alrededores del pantano del Renegado para poner en práctica los conceptos aprendidos.

EXCURSIÓN ORNITOLÓGICA A DOÑANA

Los días 18 y 19 de enero se organizó una excursión para visitar el entorno del parque nacional de Doñana, en las provincias de Sevilla y Huelva.

Salimos de Ceuta el 17 y nos acercamos a la playa Algecireña del Rinconcillo, donde se pudieron observar, entre otras especies, una cerceta aliazul y un ánade gargantillo, especies raras en esta zona y de las que teníamos conocimiento previamente de su presencia en el lugar.



El día 18 se hizo un recorrido por el vado del Quema, dehesa de Abajo, dehesa de las Pilas, arrozales, caño Navarro, marisma de Hinojos, cancela de la Escupidera, huerta Tejada, casa de Bombas, etc., llevados de la mano experta de nuestro colega José Luis Anguita, conocedor de todos los entramados y recovecos de esta comarca.

El día 19 y en esta ocasión guiados por igualmente experto y conocedor de la comarca, nuestro colega Manuel Bárcenas, visitamos la laguna madre del Rocío, la Rocina, dunas de Matalascañas, cuesta Maneli, puerto de Mazagón, arroyo de las cañada de las Culebras, etc. Fueron muchas y muy interesantes las especies observadas, entre las que caben destacar el ánsar común, el tarro canelo, la cerceta pardilla, el ánade rabudo, el pico menor, el águila moteada, el búho campestre, la agachadiza común, el rabilargo ibérico, el mito común, el alcaudón real...

AVES DE LA PENÍNSULA TINGITANA



En el año 2024 se publicó el libro “*Aves de la Península Tingitana*”, cuyo acto de presentación tuvo lugar el 17 de octubre en la Biblioteca Adolfo Suárez de Ceuta.

El día 2 de febrero, con motivo de la celebración del “*Día Mundial de los Humedales*”, se hizo un nuevo acto de presentación en el Centro de Documentación e Investigación Ornitológica del Jbel Moussa (CDRO),

organizado por la Asociación Marroquí de Protección de las Aves y la Vida Silvestre (AMPOVIS), contando con la colaboración de la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta.

El 15 de marzo, en el marco de las actividades programadas para el “*Evento de Bienvenida de las Aves Migratorias*”, organizado por el Ayuntamiento de Tarifa y con la colaboración de la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta, se realizó un nuevo acto de presentación del libro en el observatorio de Cazalla.

EXCURSIÓN A MARRUECOS

El 1 de febrero se realizó una excursión a las salinas de Sidi Abdeslam, a la desembocadura del Oued Martil y al embalse de Ajas y el 2 de febrero al embalse de R`Mel.

En las marismas de Sidi Abdeslam cabe resaltar la observación de un zarapito real, en el embalse de Ajas una importante concentración de somormujos lavancos y patos colorados, en el Oued Martil garcetas grandes y en el embalse de R`Mel un porrón pardo.

En total se observaron 1.604 individuos pertenecientes a 47 especies diferentes.

XVII CONGRESO DE PSICOLOGÍA AMBIENTAL



El 6 de febrero nuestros compañeros Violeta Pina, Joaquín López, José L. Gracia y Víctor M. Campello presentaron un póster en el XVII Congreso de Psicología Ambiental, celebrado en Málaga.

En su trabajo destacaron a Ceuta como un lugar estratégico internacional para la observación de aves y mostraron el impacto que tienen las actividades realizadas por el movimiento social ornitológico de Ceuta en diversas áreas:

A nivel científico destacaron que más de 80 voluntarios de SEO-Ceuta y de la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta, a través de actividades de ciencia ciudadana, proporcionan datos a la comunidad científica internacional, fruto de actividades como censos, anillamientos y recuperación de especies incluidas las catalogadas como en peligro de extinción. Derivado de ello, destacan la participación de este grupo en proyectos, congresos y publicaciones científicas.

A nivel de educación ambiental mostraron las actividades destinadas a la conservación y regeneración ambiental, que producen un impacto directo en la población y

en la ciudad, como jornadas divulgativas y de educación ambiental, talleres y colocación de cajas nido y siembra de bellotas entre otras.

A nivel social destacan las actividades realizadas con la participación de colegios, institutos, centros de menores, asociaciones de personas con diversidad funcional, empresas de educación medioambiental y diversas asociaciones conservacionistas, es decir, iniciativas que integran a todas las personas y fomentando sentimientos de pertenencia al grupo. Además, este grupo de voluntarios coordina la lucha social para la conservación de la biodiversidad de la ciudad, fomentando sentimientos de utilidad y creando una sociedad más concienciada y, por lo tanto, más sana.

Todo esto se ha logrado en un entorno socialmente fragmentado y complejo, caracterizado por altas tasas de población flotante, migrante, de bajos recursos y diversidad religiosa donde las actividades que fomentan la cohesión social son escasas.

EXCURSIÓN A LA PROVINCIA DE CÁDIZ



El 15 de marzo se organizó una nueva excursión a la zona de La Janda y el 16 de marzo a la Barca de Vejer, a las marismas de Barbate y a la laguna de Medina.

En la Janda nos sorprendió una importante concentración de flamencos y la presencia de un búho real, en la Barca de Vejer pudimos contemplar la zona de reproducción de los ibis eremitas, donde las parejas se encontraban en proceso de construcción de los nidos, en las marismas de Barbate destacaron varios tarros blancos y un gran bando de correlimos comunes, correlimos tridáctilos, chorlitejos grandes y chorlitejos patinegros y en la laguna de Medina una gran concentración de patos colorados, una paloma zurita, varias parejas de somormujos en cortejo nupcial y zampullines culinegros.

En total se observaron 5.365 individuos pertenecientes a 83 especies diferentes.

VISITAS A JORNADAS DE ANILLAMIENTO

El 27 de marzo, usuarios del centro de "*Plena Inclusión Ceuta*" nos visitaron en la estación ornitológica de Punta Blanca. "*Plena inclusión*" es una ONG que contribuye, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida. La misión incluye también promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y

solidaria, que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y cada familia sean los protagonistas absolutos de su vida y que tengan un proyecto propio de calidad de vida, o lo que es lo mismo, tener vidas que merezcan la pena vivirse.

El 7 de abril nos visitaron alumnos del curso de “*monitores de guías de ocio*” y el 9 de abril alumnos del curso de “*monitores de información turística*”, ambos impartidos por la Cámara de Comercio de Ceuta.

El 11 de noviembre nos visitaron, en esta ocasión en la estación de anillamiento del azul del Infierno, alumnos del **Taller Experiencial RECRE-ACTÍVATE del SEPE**, impartido por la Cámara de Comercio, junto con otras personas de asociación **COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica)**.

Las visitas coincidieron con jornadas de anillamiento científico de aves, y durante la misma se procedió a mostrar a los asistentes las técnicas de capturas de aves y su posterior manejo, a las que se les colocó una anilla identificativa en el tarso y se les tomaron datos biométricos. Además se les dio una charla sobre los objetivos de esta técnica de estudio y otra sobre la migración de las aves y otras peculiaridades.

COASTWATCH CEUTA 2025

Entre los meses de marzo a mayo la Consejería de Medio Ambiente organizó el **Coastwatch Ceuta 2025**, con el objetivo de proteger y conservar el litoral de la ciudad mediante el monitoreo y la educación ambiental, fomentando el diálogo abierto, la formación y la colaboración entre instituciones, sociedad civil y sector económico. Participaron representantes de la Consejería de Medio Ambiente, de la Autoridad Portuaria, de la Delegación de Gobierno y de la Capitanía Marítima y contó con la participación de diversos sectores de la ciudad entre los que estuvieron representadas nuestras asociaciones ornitológicas.



La iniciativa, enmarcada dentro del proyecto Coastwatch Europe, pretende impulsar la educación ambiental, la ciencia ciudadana y la participación activa en la gestión sostenible del entorno marino y litoral.

Se realizaron cuatro sesiones temáticas que abordaron cuestiones claves relacionadas con la gestión, el medio ambiente, la participación ciudadana y la

economía azul.

Se realizaron cuatro “*Aulas del Mar*”. En la primera sesión, titulada «la voz de la gestión», se presentó la actual gestión del medio litoral y marino de la ciudad autónoma, explorando oportunidades para una gobernanza más participativa. En la segunda, «*la voz del planeta*», se dio a conocer el valor y los procesos naturales del medio litoral y marino de Ceuta, así como sus perspectivas futuras. En la tercera, «*La voz de la economía*» se debatió sobre las oportunidades que Ceuta ofrece para la denominada economía azul. Y en la cuarta «*La voz de la ciudadanía*», se visibilizó las diversas acciones ciudadanas organizadas que contribuyen a proteger el medio marino.

Durante el segundo semestre se realizaron dos sesiones más de las “*Aulas del Mar*”, en la primera, titulada “*Aves marinas y gestión del litoral de Ceuta*” participó nuestro compañero Joaquín López con la comunicación oral titulada “*Aves marinas de Ceuta. “Con-ciencia” ciudadana*”. En la segunda sesión titulada “*Patrimonio natural y cultural del litoral de Ceuta*”, participó otra de nuestras compañeras, Hanan Salah, esta vez con una charla sobre especies de animales marinos que viven en las costas de Ceuta, representando en esta ocasión a la Fundación Museo del Mar de Ceuta.

PASEO ORNITOLÓGICO COSTA DEL HACHO



El 27 de abril se realizó un paseo ornitológico por el camino de ronda, desde la barriada del Sarchal hasta la playa del Desnarigado. El objetivo principal fue dar a conocer la colonia reproductora de gaviota de Audouin de los acantilados del monte Hacho y concienciar sobre la necesidad de su protección.

CENSO NACIONAL DE CIGÜEÑA BLANCA

Durante la primavera se realizó el censo de la población reproductora de cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*) en Ceuta. Este evento se enmarcó en el censo nacional promovido por SEO/Birdlife durante la primavera de 2025, cuyo objetivo fue evaluar el número y la distribución de la cigüeña blanca en España. A su vez, el censo nacional se enmarcó en un proyecto de ámbito internacional: el VIII Censo Internacional de Cigüeña Blanca, realizado en todos los países que albergan poblaciones reproductoras de cigüeñas.

La cigüeña blanca habita en 54 países de Europa, el norte de África y Asia. Los socios locales de BirdLife International como SEO/BirdLife, otras ONG,

institutos científicos y otros expertos contaron durante la celebración del VIII Censo las parejas que anidan y enviaron sus registros a la base de datos central de NABU en Alemania donde se coordina el censo a nivel mundial.

A nivel local, el objetivo de este censo fue realizar una actualización del tamaño de la población reproductora de cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*) en Ceuta, a partir de censos llevados a cabo en primavera mediante la localización de nidos ocupados. Durante la primavera de 2025 se localizaron tres nidos ocupados, uno en el barrio de Los Rosales y otros dos en el barrio del Príncipe.

Atendiendo a los datos bibliográficos disponibles, la evolución temporal de la cigüeña blanca en Ceuta como reproductora se ha considerado como positiva en las últimas décadas, ya que en el anterior censo nacional (2004) no se registraron nidos ocupados.

COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS GPS A GAVIOTAS DE AUDOUIN

El 10 de mayo de 2025, por tercer año consecutivo, investigadores de la Universidad de Cádiz se desplazaron hasta Ceuta para equipar con dispositivos GPS a gaviotas de Audouin (*Ichthyæetus audouinii*) de la colonia reproductora situada en los acantilados del monte Hacho, especie catalogada como Vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).



Esta actividad se enmarca dentro del **proyecto SEANIMALMOVE**, cofinanciado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. C.17, I1.

La actuación contó de nuevo con la colaboración de varios ornitólogos locales pertenecientes al Grupo de anillamiento Chagra, el Grupo local de SEO BirdLife y la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta.

FERIA DE SOSTENIBILIDAD DEL CFIP Nº 1

El 23 de mayo el **Centro Integrado de Formación Profesional Nº 1 de Ceuta** celebró la **III Feria de Sostenibilidad**, que tiene como objetivos la promoción de la conciencia ambiental y la educación en valores sostenibles dentro de la comunidad educativa local.

En la misma tuvieron participación activa unos 100 alumnos y contó con la colaboración del IES Almina, el Museo del Mar, el grupo local de SEO/BirdLife, la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta y EcoCeuta, quienes instalaron stands interactivos para compartir sus iniciativas y proyectos relacionados con la sostenibilidad.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS OCÉANOS

Con este motivo, el 6 de junio la Autoridad Portuaria de Ceuta organizó un evento al que asistieron cientos de escolares ceutíes de todas las edades, acompañados con sus profesores. Nuestras sociedades dispusieron de un stand en el que se dio a conocer la importancia ornitológica de Ceuta, su situación clave en las rutas migratorias y sus aves "*singulares*", y se alertó sobre los principales problemas que tienen las aves insectívoras en nuestra ciudad (vencejos, aviones y golondrinas) por la destrucción de sus lugares de nidificación.

JORNADA DE OBSERVACIÓN DE RAPACES EN MIGRACIÓN



El 31 de agosto se realizó una nueva jornada de observación de aves rapaces desde el mirador de Belliones. Con estas actividades se pretende acercar el mundo de la ornitología a la ciudadanía en general, dar conocer el fenómeno de la migración del que podemos disfrutar en nuestra ciudad y poner en valor nuestro patrimonio natural.

Las especies observadas se encontraban en migración postnupcial, procedentes de Europa donde han realizado la reproducción y se dirigían a sus cuarteles de invernada en África subsahariana.

La especie más abundante fueron el milano negro, el abejero europeo y el águila calzada. También se observaron otras especies en pequeñas cantidades, entre las que cabe destacar un azor auroasiático.

FERIA ORNITOLÓGICA DEL JBEL MOUSSA

Del 5 al 7 de septiembre, con motivo del **Día Internacional de concienciación sobre los buitres**, la cooperativa Jbel Moussa Tourism Village organizó la primera Feria Internacional Ornitológica de la región, que nace con el objetivo

de ser una plataforma excepcional para ornitólogos, fotógrafos de vida silvestre y naturalistas.



En el transcurso de la jornada se expusieron varios proyectos de investigación, se expusieron stands especializados y se realizaron proyecciones sobre aves rapaces para concienciar a la población sobre la importancia de su conservación. También se realizaron otras actividades como la visita al centro de recuperación de buitres, la observación de rapaces en migración, la visita al entorno de la isla del Perejil y se organizó un concurso de fotografía.

El evento contó con la asistencia de un nutrido grupo de nuestros socios y se presentó una charla titulada *“la pardela cenicienta en Ceuta, un ejemplo de ciencia ciudadana”*

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES



Un año más, el primer fin de semana de octubre hemos celebrado el **Día de Mundial de las Aves**, una actividad que se realiza en toda España y que los grupos locales de Ceuta llevan a cabo desde el año 1999. Este año ha contado con la colaboración de la asociación DAUBMA, la Fundación Museo del Mar y la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios

Urbanos.

En esta edición el lema ha sido **Conservar a las aves y sus hábitats es frenar el cambio climático**, porque los espacios naturales bien conservados actúan como sumideros de carbono, regulan la temperatura y hacen frente a fenómenos extremos. Además, hábitats sanos y diversos son más resilientes, se regeneran mejor y ayudan a prevenir incendios forestales, una de las amenazas que cada año destruyen miles de hectáreas y los hogares de innumerables especies.

El cambio climático no es un factor aislado en los incendios forestales, sino

un multiplicador de riesgos que hace que los incendios sean más frecuentes, intensos y extensos.

Según estudios, el aumento de las temperaturas, la prolongación de los veranos secos y la sequedad acumulada del suelo favorecen que la vegetación arda más fácilmente, con menor humedad y sean más inflamable.

Celebrar el Día de las Aves es alzar la voz por la vida porque al proteger sus hábitats protegemos también nuestro propio futuro.

Las jornadas comenzaron el sábado 4 de octubre con la realización de una jornada de anillamiento en el azud del Infierno. En la misma se impartieron nociones sobre esta actividad científica y se pudo contemplar in situ la captura de aves mediante redes japonesas y su posterior marcaje con anilla metálica en el tarso. Como el lugar no admite mucha afluencia, se realizó una segunda jornada el 13 de octubre para aquellos interesados que no pudieron asistir a la primera.



El domingo 5 de octubre, en la estación ornitológica de Punta Blanca, se realizaron varios talleres sobre aves: construcción de cajas nido y comederos, identificación de aves marinas, identificación de especies locales, iniciación a la observación de aves, germinación de semillas de algarrobos para su

posterior siembra en los montes de Ceuta y promoción de la conservación del medio ambiente mediante el reciclaje.

JORNADAS DE OBSERVACIÓN DE LA MIGRACIÓN DE LA PARDELA CENICIENTA

Este año se han realizado 3 jornadas de observación abiertas al público, una más de las previstas inicialmente, los días 26 de octubre y 2 y 9 de noviembre, en la que se contabilizaron más de 16.000 ejemplares de pardela cenicienta durante las nueve horas de observación. Como es habitual, esta atractiva actividad sirvió para incorporar nuevos colaboradores en los grupos de observación.

Un año más se hicieron recorridos por las playas de la bahía sur en busca de pardelas accidentadas por causa de la contaminación lumínica, durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre, fase central de la migración. A pesar de que se produjo nuevamente un apagado parcial de las luces de la playa de la Ribera, este año se han rescatado 10 ejemplares accidentados que fueron liberados con éxito.



También se han incrementado las jornadas de observación desde embarcación, para aproximarse a la ruta de las pardelas y observarlas a muy corta distancia, con salidas semanales entre el 27 de septiembre y el 8 de diciembre. De nuevo se pudo disfrutar del espectáculo de pesca conjunta entre delfines, atunes, gaviotas, pardelas, alcatraces, y charranes en las habituales salidas por la bahía sur de Ceuta. En esta ocasión, además, se han realizado dos salidas en el mes de diciembre por el Estrecho de Gibraltar consiguiendo observaciones de otras especies menos habituales cerca de la costa, como frailecillos, alcas, págalos, cachalotes, calderones y delfines listados.

BIOMARATÓN DE OTOÑO



Celebrado del 14 al 16 de noviembre, este evento de ciencia ciudadana ha marcado un hito en la colaboración entre ciudadanos de España y Portugal para documentar la biodiversidad. Utilizando plataformas como iNaturalist, Observation.org y eBird, miles de personas se unieron para observar, registrar y compartir información sobre la riqueza natural de sus entornos. Esta experiencia no solo destacó por la gran cantidad de observaciones realizadas, sino también por el impacto que tuvo en la sensibilización y promoción del conocimiento colectivo sobre la biodiversidad.

En Ceuta, nuestra asociación difundió y participó en este evento, invitando a socios y simpatizantes a salir al campo y registrar todo tipo de fauna y plantas en las aplicaciones de ciencia ciudadana, para difundir al mundo entero la biodiversidad de nuestra ciudad.

CITAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL AÑO 2025

Texto: José Navarrete Pérez

Noticias y colaboraciones en: El Faro de Ceuta (21), El Pueblo de Ceuta (18), RTVCE (13), Ceuta Actualidad (11), RNE (6), Onda Cero (6), La Verdad de Ceuta (5), Ceuta TV (3), Ceutaldía (2), Cadena SER (1).

Los temas tratados han sido los siguientes:

- Colonia de vencejos del puerto y protección de los vencejos del museo del Revellín.
- Apadrina una caja nido.
- Día de los Humedales.
- Aguas fecales y plásticos en la playa del Tarajal.
- Impacto de los trabajos forestales de la cuna de la Legión.
- Molestias e interferencias en la colonia de gaviota de Audouin.
- Programa mensual en RTVCE *“pájaros en la cabeza”*.
- Programa *“conecta”*.
- Observaciones de marinas desde embarcación.
- Planes de Gestión de las ZEPA,s.
- Feria de Sostenibilidad del CFIP nº 1.
- Migración de aves y aves migratorias.
- Día Mundial Medio Ambiente.
- Recuperación y rehabilitación de aves.
- Abandono medioambiental de los acantilados del monte Hacho.
- Rescate de una cigüeña.
- *“Más palmeras y menos árboles, un sinsentido”*.
- Un cernícalo longevo.
- *“Bellotada”*, reforestación con alcornoques.
- Feria Ornitológica Internacional del Jbel Moussa.
- Especies autóctonas.
- Día Mundial del Ave.
- Jornadas de observación de pardelas cenicientas y accidentes que sufren por contaminación lumínica.
- Reducción del número de aves marinas.
- Actividades con COCEMFE.
- Dormidero de lavandera blanca en el puerto.



© Imagen creada con IA

**ANILLAMIENTO. PROGRAMAS DE
SEGUIMIENTO Y ESTUDIOS**

Chagra del Senegal *Tchagra senegalus*

José Navarrete Pérez, 2022. Publicado en: *Chagra del Senegal Tchagra senegalus*. En, B. Molina, A. Nebreda, A. R. Muñoz, J. Seoane, R. Real, J. Bustamante y J. C. del Moral: *III Atlas de las aves en época de reproducción en España*. SEO/BirdLife. Madrid. <https://atlasaves.seo.org/ave/chagra-del-senegal>

Distribución observada



El chagra del Senegal únicamente está presente en la zona occidental de la ciudad de Ceuta. En España peninsular existe una única cita en Tarifa (Cádiz), el 15 de julio de 1995 (Hazle, 1997). En la ciudad de Melilla y en las Islas Canarias no se ha registrado.

La especie se encuentra en la cuadrícula occidental de la ciudad de Ceuta, coincidiendo esta distribución con la observada en el atlas de reproductoras anterior (Román en Martí y Del Moral, 2003).



Fig. 1.- Distribución observada en el II Atlas (1998-2002; Martí y Del Moral, 2003) y en el III Atlas (2014-2018).




Fig. 2 Cambio en el área de ocupación entre el II Atlas (1998-2002) y III Atlas (2014-2018).

La ciudad de Ceuta, con tan sólo 20 km² de superficie, tiene su territorio dividido entre dos cuadrículas UTM de 10 x 10 km. El territorio que se encuentra en la cuadrícula occidental se encuentra en contacto con el resto del continente africano a través de una frontera terrestre de 6,3 km. El territorio de la cuadrícula oriental no tiene continuidad con la anterior, pues se trata de una pequeña península aislada por el mar, y en el istmo se encuentra el núcleo urbano que hace de barrera.

Distribución en Invierno

La distribución observada en el I Atlas de aves en invierno (Navarrete en SEO/BirdLife, 2012) se limita, igual que ocurre en primavera, a la cuadrícula occidental de Ceuta.

Tamaño y Evolución de la población

En la década de 1990 la especie era rara en Ceuta (Jiménez y Navarrete, 2001). Entre 1998 y 2001 se estimó como posible su reproducción, y se estimaba una población entonces de una o dos las parejas reproductoras que criarían de manera ocasional (Román en Martí y Del Moral, 2003). En 2003 se confirmó por primera vez la reproducción (Navarrete et al., 2003). Entre 2007 y 2010 se estimó un máximo de 10 individuos (Navarrete en SEO/BirdLife, 2012). En 2015 se confirmaron al menos seis territorios ocupados (Cárceles et al., 2017), así como su tendencia al alza (Navarrete, 2016). En 2020-2021 se han confirmado al menos 12 territorios ocupados, repartidos en una superficie de 867 hectáreas de matorral (obs. pers.). La población de Ceuta mantiene por tanto una tendencia positiva a lo

largo de las últimas décadas.

Aunque se considera sedentaria, parte de la población norteafricana puede realizar una dispersión postnupcial (Heim de Balsac y Mayaud, 1962) y existen evidencias de movimientos locales (Fry, 2020), lo que podría justificar la cita de Tarifa (Cádiz) en el año 1995 (Hazle, 1997) y, unido a la tendencia positiva observada, deja abierta una potencial colonización futura de la cuadrícula oriental de Ceuta o de la ciudad de Melilla.

Hábitat

En Ceuta ocupa zonas arbustivas y de matorral, preferentemente con vegetación densa, sin que se observen diferencias entre estaciones.

Bibliografía

- **Cárceles, J. M., Rodríguez, M. V. y Navarrete, J., 2017.** Chagra del Senegal Tchagra senegala En Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 64-2: 475.
- **Fry, H. 2020.** Black-crowned Tchagra (Tchagra senegalus). En, **J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, DA Christie y E. de Juana (Eds.): Birds of the World** versión 1.0. (Laboratorio de Ornitología de Cornell, Ithaca, NY, EE.UU. <https://doi.org/10.2173/bow.bkctch1.01> [Consulta: julio de 2021].
- **Hazle, R. 1997.** Chagra del Senegal Tchagra senegala. Observaciones de Aves raras en España. *Ardeola*, 44: 138.
- **Heim de Balsac, H. y Mayaud N. 1962.** *Les Oiseaux du Nord-ouest de l'Afrique*. Paul Lechevalier. París.
- **Jiménez, J. y Navarrete, J. 2001.** *Estatus y Fenología de las Aves de Ceuta*. Instituto de Estudios Ceutíes. Ceuta.
- **Martí, R. y Del Moral, J. C. (Eds.) 2003.** *Atlas de las Aves Reproductoras de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- **Navarrete, J., Peña, J., Rodríguez, M. V. y Guirado, M.A., 2003.** Chagra del Senegal Tchagra senegala. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 50 (2): 353.
- **Navarrete, J. 2016.** Estado actual de las especies de aves de la Península Tingitana en Ceuta. *Revista de anillamiento*, 35: 82-93.
- **SEO/BirdLife 2012.** *Atlas de las aves en invierno en España 2007-2010*. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-SEO/BirdLife, Madrid.

¿QUE FUÉ DEL...ESCRIBANO MONTESINO EN CEUTA?

Autor: José Navarrete Pérez


INTRODUCCIÓN

El escribano montesino (*Emberiza cia*) es un pájaro de 16 cm. de longitud. Habita en laderas rocosas de colinas y montañas, barrancos, claros de bosques, zonas arbustivas, terrazas cultivadas y viñedos. Suele alcanzar gran altitud en zonas de piornales y otras formaciones de matorral de alta montaña con pinos bajos y dispersos. En invierno desciende hasta sotos fluviales, bosque abiertos y áreas cultivadas. Se alimenta principalmente de semillas de gramíneas, así como de yemas, brotes y frutos diversos. En primavera y verano incorpora a la dieta insectos y otros invertebrados. Está catalogado “en régimen de protección especial” siendo sus principales riesgos la intensificación agrícola y los plaguicidas (SEO/BirdLife).

Se distribuye por el sur de Eurasia y por el norte de África. La ssp. *cia*: es residente en el oeste y sur de Europa y en el norte de África. Principaentario (Copete 2020)

En la península tingitana es residente escaso con aporte de algún invernante, principalmente en zonas de alta montaña. En el Jbel Moussa es reproductor común. En Ceuta en la década de los 90 era residente escaso en la zona continental. No ha sido registrado en el monte Hacho (Navarrete et. al. 2024).

Gráfico nº 1.- número de anillamientos desde 1985 hasta 2025 y línea de tendencia



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Entre los años 1985 y 2025 (a.i.) se ha procedido al marcaje de 29 ejemplares capturados para su anillamiento científico en la zona continental de Ceuta. No ha habido capturas en el monte Hacho. La mayoría de estas capturas (24 ejemplares) se realizaron durante la primera decena de seguimiento (1985-1994). A partir de 1994 sólo se capturan cuatro ejemplares en los años 2005, 2015, 2016 y 2017 (uno en cada año). A partir de 2018 no se ha capturado ningún ejemplar (Gráfico nº 1). La tendencia es claramente negativa y presenta un declive acusado.

Desconocemos los motivos concretos que han causado este descenso en la pequeña población de Ceuta del escribano montesino, catalogada de “escasa” en los años 90 como se ha comentado, pero se pueden aventurar los siguientes: la desaparición de antiguas huertas (sobre todo en el arroyo de Calamocarro), los importantes incendios que se han venido produciendo en los últimos años y el cambio climático que ha alterado los habitats y la pluviosidad. En España, esta especie presenta un declive moderado tanto a largo plazo (1998-2023) como a corto plazo (2012-2023) (Scandell et al. 2023).

BIBLIOGRAFÍA

Copete, J.L., 2020. Rock Bunting (*Emberiza cia*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

Navarrete J., López J. y El Khamlichi R., 2024. *Las Aves de la Península Tingitana*. Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta.

SEO/BirdLife: seo.org/ave/escribano-montesino/

Scandell V., Herrando S. y Escudero E., 2023. En *Programas de Seguimiento y Grupos de Trabajo de SEO/BirdLife 2023*. pp.78-81. SEO/BirdLife. Madrid.

LITORAL DE CEUTA

Este año hemos empezado antes con las salidas en barco con el objetivo de aprovechar el período en que las pardelas cenicientas se alimentan en las costas de Ceuta antes de iniciar la migración, acompañadas habitualmente de atunes y delfines que ofrecen escenas que se quedan grabadas en la memoria de todos los que vienen a disfrutar del espectáculo. Afortunadamente, en el grupo tenemos unos fotógrafos excelentes que nos van a ayudar a contar lo que hemos vivido. Empezamos con esta foto de Andrés Martínez que captó a estos delfines comunes navegando frente a la playa de la Ribera, situada en el centro de la ciudad.



SALIDAS EN BARCO DURANTE EL PASO POSTNUPCIAL

Autor: Joaquín López Rodríguez


Maquetación: Antonio J. Cambelo Jiménez



© Cecilio Castillo



La primera salida fue el 27 de septiembre, el mar en calma favoreció la formación de balsas de pardelas por lo que se pudieron sacar buenas fotos, como estas que hizo Joaquín Sánchez, también pudo captar una escena de "caza" de un pez volador por una pardela cenicienta. La foto que ilustra la doble página es de la compañera Salomé Quiroga y se puede ver una balsa de pardelas con el peñón de Gibraltar de fondo, una bonita instantánea del Estrecho.





Tampoco faltaron ese día los delfines comunes, que no pudieron resistir la atracción de los peces voladores. Fotos realizados por nuestra compañera Salomé Quiroga.



La segunda salida fue la más variada, con varias especies de aves y la sorpresa de los delfines mulares, que fueron localizados por la agudeza visual de Blanca Valero, a unas 4 millas de la costa. Sin duda, mereció la pena salir de la ruta habitual. Andrés Martínez y José Manuel Díez consiguieron captar uno de los saltos más espectaculares.



Delfín mular

También se observaron delfines comunes, atunes y un extraño pez luna, que no sabemos si será *Mola mola* o es otra especie. Foto José Manuel Díez.





Charrán bengalí



Págalo grande



Pez luna


Además de las pardelas cenicientas y charranes patinegros, también se pudieron observar charrán bengalí y págalo grande. Fotos Joaquín Sánchez Espinosa.

Una de las curiosidades que observamos durante estas jornadas fue que las pardelas estaban disfrutando del buen tiempo y de la abundante comida y se dan baños sumergiéndose en el agua para después sacudirse las plumas, algo así como lo que hacen las gaviotas en la orilla. José Manuel captó con su cámara este bonito momento.

La segunda semana de octubre se presentó con tiempo inestable, por lo que se planificaron dos días de salida por si alguno fallaba y al final se pudieron hacer las dos.

El jueves 9 de octubre el poniente amenazaba con estropear la jornada, de hecho, las dos primeras horas fueron bastante incómodas y nos limitamos a navegar por la bahía sur sin asomar mucho la proa a punta Almina. A pesar de ello no faltaban las pardelas cenicientas y los charranes bengalíes y patinegros, pero el viento no dejaba hacer buenas fotos. Sin embargo, cuando ya poníamos rumbo al foso de San Felipe observamos un importante barullo a escasos metros de la costa, entre Fuentecaballos y la Peña. Al acercarnos pudimos comprobar como gaviotas, pardelas y delfines se estaban montando un festín a 20 metros de la orilla, no pusimos capturar imagenes porque nos pilló un poco lejos y a contraluz, pero que permite comprobar lo cerca que estaban los delfines y las pardelas de tierra firme.

Cuando ya terminaron de comer, los delfines volvieron a coger rumbo mar adentro y fue cuando nos encontramos con toda la manada navegando al lado de nuestra embarcación. Aquí podéis ver algunas fotos de Andrés Martínez y un vídeo en este enlace: <https://youtu.be/Dha8una471k>





Fumarel común

En lo que respecta a las aves, Félix Fernández pudo fotografiar nuevas especies que no se habían visto en salidas anteriores.

Tampoco faltaron los charranes patinegro y bengalíes, los primeros ya están llegando para pasar el invierno mientras los segundos pasando sus últimos días en el Mediterráneo.



Charrán común

Otra de las escenas habituales de estas fechas es ver a las jóvenes patiamarillas intentando robar la pesca a las pardelas cenicientas y muchas de ellas lo consiguen. Fotos Félix Fernández.



Charrán patinegro

La última salida de la primera quincena la hicimos con un tiempo ideal, un levante flojito que permitió dar una vuelta por la bahía norte y adentrarnos un poco más en el estrecho de Gibraltar. Allí nos encontramos con una pequeña familia de delfines, sin embargo, no había nada especial en cuanto a aves. De vuelta a la costa los protagonistas fueron los atunes, que saltaban por todos lados a bastante distancia del barco. A pesar de ello, Andrés Martínez pudo captar alguno de los lances.

Poco a poco fuimos navegando hacia la bahía sur que se encontraba llena de pequeños peces por todas partes. Aunque esto pueda parecer una ventaja, al haber tanta disponibilidad de alimento las pardelas estaban muy dispersas y no se llegó a formar ninguna de las escenas que tanto nos gustan, con ataques por el mar de delfines y atunes y desde el aire por parte de las aves marinas. A la vista de este panorama nos situamos frente a la playa del Sarchal intentando dejar el sol a nuestra espalda, esperando que las pardelas se acercarán a nuestra posición. Allí se consiguieron buenas fotos de pardelas cenicientas mediterráneas, alguno de los escasos alcatraces que todavía han llegado a la zona y charranes patinegrós. *Fotos Joaquín Sánchez.*



Pardela cenicienta



Charranes patinegrós

De vuelta a puerto allí nos esperaba la misma garza real de todos los días, un ejemplar invernante que en esta ocasión fue fotografiada por Andrés Martínez.

Con esta salida terminamos la primera quincena de octubre con un balance muy positivo. Después de un pequeño parón por el levante volveríamos al tajo en el fin de semana del 25-26 de octubre, previsiblemente con el flujo migratorio ya activo.



Garza real



Alcatraz atlántico

Después de que diéramos por finalizada la temporada de rescates y de algunos días de observación desde la playa del Desnarigado, nos quedó la sensación de que este año no habían pasado todas las pardelas que tenían que haberlo hecho. Con esta convicción, continuamos con las salidas en barco durante la segunda quincena de noviembre, con un resultado realmente sorprendente.

En la salida del 18 de noviembre, ya fuera de las fechas habituales de migración, el paso fue continuo durante toda la tarde con una estima superior a las 3.500 pardelas/hora. Además, la jornada tuvo algunas sorpresas agradables como la observación de esta pardela cenicienta leucística, peces luna o dos tortugas bobas.



Pardela cenicienta leucística

Parecía que este podía ser el último gran día en la bahía sur y poner un bonito final a la migración de la pardela cenicienta por esta temporada, pero el 26 de noviembre hubo nueva salida y... ¡Sorpresa! el paso continuaba por encima de las 3.500 aves/hora.



Como novedad, nuestro compañero Félix Fernández consiguió fotografiar una pardela balear.



Pardela balear

Desde el otro lado del Estrecho, Cuco Fuentes nos iba comentando cómo estaba el paso por la parte norte. "El ojo que todo lo ve", como le apodan sus compañeros de CIRCE, vigila el Estrecho desde su atalaya en busca del paso de cetáceos para informar de su ubicación al resto de sus compañeros, que trabajan desde embarcación en un proyecto de marcaje de rorcuaes y cachalotes. Amablemente, Cuco nos hacía llegar información de cómo iba la jornada en cuanto a aves marinas

Animados por el buen estado de la mar y por las informaciones de Cuco, el compañero Manuel Rodríguez planteó una nueva salida para el 29 de noviembre, pero esta vez el objetivo era dirigirse al norte y adentrarse en el Estrecho de Gibraltar.



Embarcación de CIRCE

El resultado fue una vez más espectacular, superando todas las expectativas. Nada más empezar la jornada salió el premio "gordo", un maravilloso cachalote que posteriormente fue marcado por los compañeros de CIRCE. Aquí os dejo algunas fotos de Joaquín Sánchez, Félix Fernández y Miguel Ángel Guirado.



Durante toda la jornada también se observaron numerosos delfines listados, especie que tampoco había sido vista en nuestras salidas por la bahía sur.

Además de los cetáceos se vieron alcatraz atlántico, pardela cenicienta, pardela balear, frailecillos, alcas, gaviotas cabecinegras y dos rorcuales. Las fotos son testimoniales porque las aves y los rorcuales pasaron lejos de la embarcación. (Fotos: Joaquín Sánchez, Félix Fernández y Miguel Ángel Guirado).



Félix Fernández consiguió fotografiar (izquierda) una pardela balear "clarita", tal vez una "menorquina".

Para finalizar la temporada, la última salida se llevó a cabo el 8 de diciembre, con observaciones de nuevas especies y mejores fotos de aves (Fotos: Víctor Campello, Salomé Quiroga y Félix Fernández).



Págalo grande



Los cetáceos volvieron a ser los protagonistas con grandes grupos de calderones y delfines listados y un nuevo, aunque lejano, cachalote (Fotos: Víctor Campello, Salomé Quiroga y Félix Fernández).

Con esta salida damos por finalizada la temporada por este año, empezamos a finales de septiembre y hemos terminado ya entrado el mes de diciembre, dos meses y medio llenos de emociones y buenas observaciones, en cuyas salidas han pasado muchos compañeros del grupo pero también amigos y visitantes de nuestra ciudad, que han conseguido llevarse una visión totalmente novedosa de nuestra tierra. Gracias a los compañeros por compartir sus fotos, sin ellas no podríamos transmitir la belleza de lo que hemos vivido. Definitivamente, este ha sido un final de temporada ¡espectacular.



José Navarrete Pérez

Anillamiento.- Durante el año 2025 el grupo de anillamiento CHAGRA ha procedido al anillamiento de 2.431 aves en la ciudad de Ceuta, pertenecientes a 65 especies diferentes (tabla 1).

Las estaciones de anillamiento de passeriformes han sido las tradicionales de Punta Blanca (cañaveral y arbustos), arroyo del Infierno (bosque y matorral) y monte Hacho (matorral y arbustos). Para más información véase el artículo “Estaciones de Anillamiento de Ceuta” en el nº 9 de esta revista.

Los datos correspondientes a los proyectos de cernícalo vulgar, gaviota patiamarilla y gaviota de Audouin son objeto de sendos artículos en este mismo número de esta revista.

Autocontroles.- Se han realizado 317 controles locales de 24 especies diferentes (tabla 1). Cabe destacar por su longevidad los siguientes:

- un pinzón africano, anillado en 2019.
- un chochín paleártico y un carbonero común, anillados en 2020.

- un pinzón africano, un herrerillo canario y un curruca capirotada, anillados en 2021.

Recuperaciones.- Se ha recibido de la oficina de anillamiento la siguiente recuperación:

- serán verdicillo, anillado el 18-10-24 en Gibraltar, recuperado el 12-03-25 en el azud del Infierno. 25 km., 145 días.

	Punta Blanca	Ayº Infierno	Monte Hacho	Proyecto cernícalos	Proyecto gaviotas	Centro recuperación	Total anilladas	Recuperaciones	TOTAL
abubilla	3						3		3
acentor común			1				1		1
agateador europeo		1	1				2		2
alcaudón común	2	4				1	7		7
buitron	1	9					10	4	14
bulbul naranjero	17	19	5			1	42	26	68
camachuelo carminoso		1					1		1
carbonero común	20	18	8				46	41	87
carricerín real		8					8		8
carricero común	2	64					66	2	68
carricero tordal		1					1	1	2
cernícalo vulgar				23			23	1	24
cetia ruiseñor		1					1	7	8
chagra del Senegal	1	3					4	1	5
chochín paleártico	1	8					9	9	18
chotacabras cuelliroyo						1	1		1
colirrojo real		4	1				5		5
colirrojo tizón		6	22				28		28
collalba gris	1						1		1

	Punta Blanca	Ay° Infierno	Monte Hacho	Proyecto cernícalos	Proyecto gaviotas	Centro recuperación	Total anilladas	Recuperaciones	TOTAL
cuco común						1	1		1
curruca cabecinegra	32	57	39			1	129	97	226
curruca capirotada	78	206	63			1	348	49	397
curruca carrasqueña	5	1	1				7		7
curruca mirlona	2	3					5		5
curruca mosquitera	11	43	2				56		56
curruca rabilarga			1				1		1
curruca zarcera	2	13	5			1	21		21
escribano hortelano			4				4		4
escribano sahariano	1					6	7		7
escribano soteño	1	2					3	5	8
gaviota de Audouin					10		10		10
garcilla bueyera		1					1		1
gaviota patiamarilla					127	56	183	1	184
gaviota sombría						2	2		2
golondrina común	1	43					44		44
gorrión común	62	13	1			4	80	16	96
herrerillo canario	14	57	4			5	80		80
jilguero lúgano	7	4	1				12		12
jilguero europeo	63	7	7				77		77
martín pescador		4					4	1	5
mirlo común	5	17	1			1	24	2	26
mochuelo europeo						1	1		1
mosquitero común	51	110	86				247	15	262
mosquitero ibérico	5	18	1				24		24
mosquitero papialbo	1	3	10				14		14

	Punta Blanca	Ay° Infierno	Monte Hacho	Proyecto cernícalos	Proyecto gaviotas	Centro recuperación	Total anilladas	Recuperaciones	TOTAL
mosquitero silbador			1				1		1
papamoscas cerrojillo		17	3				20		20
papamoscas gris	2	10					12		12
pardela cenicienta						10	10		10
pardillo común	8	2	17				27		27
petirrojo europeo	9	30	50				89	19	108
mosquitero musical	26	19	45			1	91		91
pinzón africano	12	39	20				71	11	82
pinzón europeo	1		2				3		3
pinzón real			1				1		1
reyezuelo listado	1	3					4		4
ruiseñor común	13	9	3				25	2	27
serin verdecillo	155	75	9			1	240	4	244
tarabilla común			1				1	1	2
tarabilla norteña		1	1				2		2
vencejo pálido						3	3		3
verderón común	73	8	5				86	1	87
zarcero bereber	2	5				1	8		8
zarcero común	9	68	2			3	82	1	83
zorzal común		1	10				11		11
TOTALES	700	1036	434	23	137	101	2431	317	2748

Tabla 1.- Cómputo de especies anilladas y recuperadas en 2025

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE MARCAJE DE CERNICALO VULGAR (*Falco tinnunculus*) CON ANILLAS DE PVC EN CEUTA DURANTE EL AÑO 2025

Autor: Antonio José Cambelo Jiménez



La presente memoria resume los resultados obtenidos durante 2025, decimosexto año de la campaña de marcaje con anillas de pvc de la especie, Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*) en Ceuta, esta modalidad de anillamiento comenzó en el año 2009 cuando conociendo la existencia de un programa de anillamiento con pvc de esta especie, coordinado por la Estación Biológica de Doñana, se ofreció la colaboración del grupo de anillamiento Chagra.

Con este nuevo tipo de marcaje -siendo esta la primera vez que se utilizaba en Ceuta- se espera aumentar considerablemente la información sobre esta especie en Ceuta.

Metodología: Métodos de captura

El proyecto consiste en marcar los ejemplares capturados, además de la preceptiva anilla metálica con remite de la Sociedad Española de Ornitología en el tarso derecho, con una anilla de PVC de color, con código alfanumérico en color que contraste en el izquierdo. La dirección de lectura de arriba hacia abajo. Para la captura y anillamiento de los cernícalos se han seguido dos métodos principalmente: el anillamiento de pollos en nido y la captura con trampa de lazos corredizos (ball-chatri). Adicionalmente se marcan también los ejemplares recuperados en las instalaciones de Obimasa.

Objetivos

Dejando a un lado los objetivos que persigue el programa por parte de la Estación Biológica de Doñana, a nivel local la principal incógnita a resolver es la de la dispersión juvenil ¿a dónde van los jóvenes que nacen en Ceuta?, no obstante, a lo largo del tiempo han surgido mas cuestiones por resolver, estas son:

- a) Descubrir el destino de los movimientos de dispersión postnupcial de los jóvenes nacidos en el territorio de Ceuta.
- b) Determinar las tasas de supervivencia y longevidad de los Cernícalos ceutíes.
- c) Comprobar la composición de las parejas nidificantes, su fidelidad, etc.
- d) Verificar el éxito en la reintroducción de los ejemplares recuperados por el C.R.E.A. de Obimasa y su supervivencia en la naturaleza.

A pesar de las expectativas inicialmente puestas en el marcaje con anillas de pvc y su posible repercusión en el aumento de observaciones y controles, los resultados no han sido los que se esperaban, a la vista de las pocas observaciones registradas. Todos los controles registrados con el marcaje con anillas hasta ahora son de aves localizadas en el territorio de la Ciudad Autónoma de Ceuta, no existiendo hasta el momento de redactar esta memoria las recuperaciones lejanas (a excepción de los datos registrados por lo dispositivos GSM). Estas circunstancias elevan la previsión inicial del plazo de tiempo en el que se prevé en estos momentos la obtención de resultados.

A la vista de la dificultad de la lectura de las anillas, se ha optado por complementar el marcaje de algunos cernícalos (especialmente pollos) con marcas alares patagiales, sistema de mucha mayor visibilidad y que seguramente aumentará el número de controles y observaciones.

Gracias a la colaboración de la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta, se han adquirido marcas alares para un programa, ya aprobado por la Estación Biológica de Doñana y el coordinador europeo para marcajes de este tipo. Este año también se ha colocado un dispositivo GSM a un ave joven del año, capturada durante la campaña.

EDAD	EJEMPLARES
Pollos anillados en nido (1)	0
Juveniles en su primer año (3)	17
Aves nacidas antes del presente año (4)	0
Aves en su segundo año de vida (5)	3
Aves de más de dos años de vida (6)	2
TOTAL	22

En base a los datos obtenidos el pasado año, cabe destacar:

1.- Con el marcaje de un joven del año con el dispositivo **GPS/GSM MINI de 5 gramos sin antenas externas**, se ha obtenido escasa información esta temporada, debido a los pocos días de vida del ave después de ser marcada, esta información **se expone de manera extensa en otro artículo en esta revista**.

Conclusiones

Con estos datos preliminares se ha obtenido información que confirma la hipótesis sostenida por el autor sobre la dirección que toman las aves jóvenes del año en su dispersión juvenil y abren camino a profundizar en nuevos datos no esperados:

1.- Las cuatro aves marcadas con dispositivos hasta el momento se han desplazado hacia el sur.

2.- A falta de mas datos de aves marcadas con dispositivos que sobrevivan al primer invierno, los desplazamientos como mínimo han llegado a la altura del Alto-Medio Atlas y como máximo han traspasado la frontera sur de Marruecos.

3.- Las hembras han realizado desplazamientos directos y solo con descansos de pocos días para reponerse. Ambas en dirección suroeste paralelos a la costa atlántica de Marruecos.

4.- El macho sin embargo llevó a cabo dos desplazamientos cortos y breves, volviendo de nuevo al lugar donde fue capturado en Ceuta. La trayectoria en el tercer viaje y definitivo, fue menos directo, aunque siguió también dirección suroeste.

5.- En el caso del cuarto ave marcada, de sexo indeterminado (posiblemente un macho) realizó su dispersión paralela a la costa oriental de la península tingitana, posteriormente continua en dirección sur atravesando en Alto Atlas, Medio Atlas y Anti-Atlas, desapareciendo tras cruzar la frontera con Argelia.

6.- Del quinto ave no es posible sacar conclusiones ya que falleció a los pocos días de cruzar la frontera de Ceuta con Marruecos.

7.- Las aves en los lugares en los que se han establecido varios días han mostrado una clara rutina con zonas diferenciadas de alimentación y descanso nocturno.

8.- Fidelidad de las aves adultas a sus territorios y los jóvenes a los territorios donde nacieron.


9.- Se ha detectado una esporádica actividad nocturna, desconociéndose las causas.

En el año 2025, se han podido anillar veintidós aves, considerando que estos resultados han estado ligeramente por debajo de las expectativas. Se siguen estudiando nuevos sistemas y técnicas de trampeo, para mejorar los resultados obtenidos.

Este proyecto y el siguiente cuentan con la subvención de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

El diario que recoge los datos mas significativos de las diferentes campañas de anillamiento de Cernícalo vulgar queda plasmado en el Blog Anillando Cernícalos.

<http://kestrelman.blogspot.com>



BUSCAR EN ESTE BLOG

Buscar

MIÉRCOLES, 10 DE FEBRERO DE 2021

Primera lectura de Cernícalo con marca alar en Ceuta

Hola a todos por fin he tenido una buena noticia en relación al marcaje de los cernícalos ceutíes con marcas alares patagiales. Como seguramente sabréis los que habéis seguido mis andanzas en este blog, tras comprobar los escasos resultados obtenidos con las anillas de pvc en el grupo de anillamiento Chagra decidimos colocar también marcas alares en mi proyecto de marcaje del Cernícalo vulgar en Ceuta, con la esperanza de aumentar los contactos y recuperaciones.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

WeatherOnline

Ceuta

Pronóstico 21 mar 2021

15°C

>> 4 días | >> Tendencia

© wuolapartners

PALABRAS CLAVE

- OMH (1)
- ICA (1)
- ICH (1)

ARCHIVO DE ENTRADAS

- ▼ 2021 (1)
- ▼ febrero (1)
- Primera lectura de

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE UN CERNÍCALO VULGAR (*Falco tinnunculus*) MARCADO CON UN DISPOSITIVO GSM EN 2025





Autor: Antonio J. Cambelo Jiménez



El cernícalo elegido para colocar el dispositivo GSM, es una hembra joven del año se captura el 11 de agosto de 2025 en la zona de Mendicuti, el día 12 estuvo cazando por la zona donde fue capturada por la ladera sur, aprovechando los vientos de levante que rebotan en esas pendientes.

El día 13, se detectó un primer movimiento exploratorio llegando hasta el Yebel Musa, al otro lado de la frontera de Ceuta. El día 14 pasado el mediodía vuelve a salir de las fronteras de Ceuta y se aventura más lejos quedándose a pasar la noche en una zona de monte no muy lejos del macro puerto de TangerMed. Pasado el mediodía del 15 cruza de nuevo a Ceuta, una visita fugaz porque a las 20:30 horas nuevamente pasa a territorio marroquí, esta vez por la costa norte, sobrevolando

**Localizaciones del 14 y 15 de agosto****Localizaciones del 15 al 16 de agosto****Tarde-noche 16 de agosto**

la playa y el pueblo de Belyounech, continuando hasta un cerro en El Horia y desde ahí vuela en dirección norte adentrándose casi 3,5 kms. sobre el mar, parece arrepentirse y retrocede hacia tierra sobrevolando de nuevo el Yebel Musa en dirección sureste.

A primeras horas de la tarde del día 16 retorna de nuevo a nuestro territorio entre las torres de San Francisco de Asís y Mendizábal.

El 17 de agosto, emprende su último viaje. Cruza la frontera de Ceuta con Marruecos cerca del centro penitenciario de Mendizábal (zona por la que ya cruzaron alguno de los cernícalos marcados en años anteriores), el trayecto tiene primero una orientación suroeste para girar después a dirección oeste.

Después de este último contacto no se reciben datos y la impresión es que el ave a muerto, pero en los últimos días (mayo de 2026) se han recibido datos muy interesantes. Debido al cierre de la maqueta para la remisión a la imprenta de la revista, no ha sido posible la inclusión de esos datos en este número. En el próximo se incluirá en un artículo. **Este proyecto ha sido subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Ceuta.**

LOS LIMICOLAS INVERNANTES EN CEUTA

Autor: Antonio J. Cambelo Jiménez



© www.avesdeceuta.com

En el presente artículo vamos a dar a conocer una serie de especies de aves invernantes o que se detienen durante un tiempo durante sus desplazamientos migratorios en las costas de Ceuta. Agrupamos a estas especies con el calificativo genérico de aves limícolas por el tipo de habitat en el que se reproducen y buscan el alimento.

Se alimentan en costas rocosas, estuarios de ríos, marismas o playas arenosas.



VUELVEPIEDRAS COMÚN (*Arenaria interpres*)

El vuelvepedras común se distribuye, durante la época de reproducción, por áreas costeras en torno al Ártico de todo el hemisferio norte, alcanzando por el sur los países escandinavos. Es un migrador de larga distancia que llega a España procedente del norte de Europa.

El vuelvepedras común se reproduce siempre en las inmediaciones de las costas continentales e insulares, en lugares dominados por frías tundras, donde soporta adversas condiciones meteorológicas.

Fuera de la época reproductora es casi completamente costero, aunque prefiere orillas pedregosas, rocosas o cubiertas de algas, además de estructuras artificiales, como rompeolas, puertos, embarcaderos y corrales para moluscos. Precisamente las costas rosas de la bahía norte de Ceuta son el habitat preferido para invernar en nuestras costas.

En la foto principal ave en plumaje estival, en recuadro librea invernal.



Fenología de Ceuta en ebird.org

© Andrés Martínez

ANDARRÍOS COMÚN (*Actitis hypoleucos*)

El andarríos chico se extiende por gran parte de Eurasia como reproductor, aunque se hace más raro y de distribución fragmentada hacia el sur. Parte de la población migra e invernada en el sur de Europa, Asia meridional, África y Oceanía.

Se distribuye por toda la península, supeditando su presencia a la de arroyos, ríos y embalses, por lo que resulta más frecuente en la mitad norte y en zonas de cierta altitud. Siendo más escaso en el sur y levante.



© Joaquín Sánchez Espinosa



Fenología de Ceuta en ebird.org

Cria de forma muy dispersa por ríos, arroyos y embalses de la Península, donde ocupa ensenadas, bancos arenosos y acumulaciones de grava. En migración e invernada puede aparecer también en estuarios, marismas, playas y áreas rocosas. Se alimenta de invertebrados (fundamentalmente insectos, tanto terrestres como voladores), que captura sobre la superficie del agua o en orillas fangosas.

En Ceuta, es un invernante escaso, observándose algunos ejemplares aislados tanto en la bahía sur como la norte.

CORRELIMOS TRIDÁCTILO (*Calidris alba*)

El correlimos tridáctilo es una especie que cría en torno al Ártico, en costas septentrionales de América, Groenlandia y norte de Asia. Es una de las aves que efectúa mayores desplazamientos en todo el planeta, ya que inverna en la zona meridional de Sudamérica, África del Sur y tropical e incluso Australia y Nueva Zelanda. También hay invernantes en Europa y en la cuenca mediterránea. Es una especie invernante en la Península, Baleares y Canarias, con un marcado paso migratorio y escasos veraneantes.

Se instala durante la época reproductora en altas latitudes de climas muy fríos, donde abundan terrenos cubiertos con céspedes, líquenes y musgo. Fuera de esa época se decanta por ocupar principalmente playas y, de forma marginal, salinas, lagunas y medios similares cercanos a la costa, así como aguas interiores.



Fenología de Ceuta en ebird.org

Se alimenta, esencialmente, de pequeños invertebrados. En época reproductora captura muchos insectos, sobre todo adultos y larvas de moscas, así como escarabajos, mariposas o arañas. También consume crustáceos y, en momentos de escasez, puede aprovechar materia vegetal.

El correlimos tridáctilo es una limícola de pequeño tamaño y de plumaje bastante pálido, al que se suele ver recorriendo las playas con una veloz carrera, mientras persigue a las pequeñas presas que arrastra el oleaje. En Ceuta, se han visto pequeños grupos en las playas arenosas.

ZARAPITO TRINADOR (*Numenius phaeopus*)

El zarapito trinador se reproduce en áreas septentrionales del hemisferio norte: en Norteamérica, Islandia, norte de Europa y norte de Asia. Durante la invernada se desplaza considerablemente al sur, pues llega a alcanzar los extremos meridionales de América, África, Asia y Oceanía. El paso posnupcial por la Península tiene lugar entre julio y septiembre y el prenupcial en abril y mayo. La partida de sus zonas de invernada en África se produce en marzo y los efectivos alcanzan Europa entre la segunda quincena de abril y los primeros días de mayo.



Fenología de Ceuta en ebird.org



El zarapito trinador cría, frecuentemente, cerca de la costa, pero no se encuentra estrictamente ligado al litoral, por lo que puede adentrarse en el interior y ocupar hábitats propicios (páramos húmedos, brezales e incluso terrenos arenosos) desde el nivel del mar hasta los 700 metros de altitud. En migración e invernada se manifiesta como un ave muy costera y aparece en marismas, zonas intermareales o estuarios.

En Ceuta tiene predilección por las zonas rocosas de la costa .

OSTRERO EUROASIÁTICO (*Haematopus ostralegus*)

El ostrero euroasiático se distribuye ampliamente por numerosas zonas templadas y subárticas de Europa y Asia. Se reproduce en Islandia, norte de Noruega, Finlandia y en torno al mar Negro. Una parte de la población europea es migradora y pasa el invierno en las costas meridionales del continente (incluida la Península Ibérica) y en el norte de África.

Nidifica en lugares diversos, como playas arenosas apenas visitadas por el hombre, estuarios, complejos dunares con escasa vegetación, isletas en marismas, salinas, islotes accesibles durante la bajamar, en el límite inferior de los acantilados e, incluso, en campos de cultivo.



Fenología de Ceuta en ebird.org



En áreas interiores consume, mayoritariamente, lombrices de tierra, gusanos e insectos adultos. En regiones costeras, sin embargo, ingiere una gran variedad de presas. Puede utilizar su pico para alimentarse en la oscuridad mediante el tacto, aunque también es lo suficientemente fuerte como para perforar las defensas de bivalvos y cangrejos. De igual manera, los ostreros utilizan este eficaz instrumento para sondear en el lodo en busca de gusanos y para despegar lapas y caracoles de las rocas.


En Ceuta se le puede ver esporádicamente.

CHORLITEJO GRANDE (*Charadrius hiaticula*)

Se distribuye como reproductora por altas latitudes del hemisferio norte, desde Norteamérica hasta Siberia. En Europa se localiza en las islas Británicas, el norte de Francia, Islandia, Escandinavia y las regiones bálticas, no se reproduce en España, aunque durante la invernada se puede considerar un ave relativamente común en las costas atlánticas y algo menos habitual en el litoral mediterráneo.

Los desplazamientos migratorios suelen realizarse por la costa, aunque también se han observado aves en localidades propicias del interior. El paso prenupcial se verifica entre abril y mayo, mientras que el posnupcial tiene lugar entre agosto y octubre, tanto en las costas atlánticas como en las mediterráneas.

En invierno y durante la migración tiende a concentrarse en amplias zonas arenosas, así como en playas con guijarros que cuenten con emplazamientos de descanso apropiados por encima de la línea de pleamar.



Fenología de Ceuta en ebird.org



En áreas de reproducción se alimenta de pequeños invertebrados terrestres y costeros, mientras que fuera de la estación reproductora suele incluir en su dieta gusanos poliquetos, crustáceos y moluscos. Para capturarlos localiza a las presas con la vista y, tras una corta carrera, las atrapa con el pico.

Rescate de pardelas cenicientas (*Calonectris diomedea*) durante su migración postnupcial por Ceuta



Joaquín López Rodríguez¹ y Miguel Ángel Guirado Cajal¹

¹ Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta

La contaminación lumínica es uno de los problemas que tienen las pardelas cenicientas en su paso por Ceuta. Tal vez sea difícil de entender cómo, en un lugar que está a más de 250 km de la colonia de cría más cercana, se pueda dar este problema en un ave pelágica. La explicación se encuentra en el “extraño” recorrido que hacen las pardelas en su ruta migratoria que, en vez de embocar directamente el Estrecho, siguen hacia el sur y cuando se encuentran con la costa africana cambian el rumbo y costean la bahía sur de Ceuta, pasando muy cerca de sus playas.

Este acercamiento a la costa se ve peligrosamente incrementado cuando cae la noche, especialmente cuando llegan los jóvenes del año que, debido a su inexperiencia, se dejan engañar por el potente alumbrado de las ciudades.

Para evitar los efectos negativos de la contaminación lumínica en las pardelas cenicientas, nuestra asociación solicita todos los años el apagado de las luces de las playas de la bahía sur, y se consigue un apagado parcial de las luces de la playa de la Ribera. Sin embargo, la playa del Chorrillo, el puente del paso elevado de Miramar y la calle Independencia (situada encima de la playa de la Ribera) siguen con una iluminación excesiva.

Debido a ello, estos lugares han sido los “puntos negros” dónde se han producido la mayoría de los accidentes de este año. La primera pardela apareció el 27 de octubre en la calle Independencia. Tras ella, dos más esa misma noche,

una en la playa de la Ribera y otra en la del Chorrillo. La mañana siguiente nos llegó el aviso de una nueva pardela localizada en la escalera central de la playa del Chorrillo y ya por la noche del 28 de octubre se localizó otra pardela más en la calle Independencia.

Estos cinco ejemplares fueron liberados con éxito en la mañana del 29 de octubre.

Esa misma mañana apareció otra nueva pardela en un sitio nada habitual, la Mezquita de Mouley El-Mehdi, acurrucada debajo de un banco. Esta pardela fue recogida por la empresa Ecoservicios y fue entregada a nuestro compañero y veterinario Miguel Ángel Guirado.

La mañana del 2 de noviembre el aviso llegó por Facebook. Alguien puso en un grupo que en la playa del Chorrillo había una “gaviota” que no podía volar. La foto no dejaba dudas, era una pardela y rápidamente nuestra compañera Miriam se acercó a recojerla.

La noche del 3 de noviembre, mientras hacíamos la ronda por la playa de la Ribera, avisaron a Andrea de una pardela que había caído en la carretera a la altura de Miramar y hasta allí nos dirigimos para rescatarla. Al final resultó ser un doble rescate, porque nos avisaron de otra en el puente elevado que pasa por encima de la carretera y que conecta la barriada con la playa.

Para finalizar, la última pardela de la temporada la trajeron de Obimasa en malas condiciones, por lo que tuvo que pasar tres días en recuperación antes de liberarse el domingo 9 de noviembre.

En total, la temporada se cerró con 10 rescates, un número elevado con respecto a las tres últimas temporadas, en las que el apagado parcial de alumbrado de la playa de la Ribera había tenido un efecto positivo.

Todas las pardelas recuperadas fueron ejemplares jóvenes del año y se liberaron en buenas condiciones.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se ha llevado a cabo por un equipo de personas voluntarias: Mila Martínez, Miriam Verdú, Miguel Ángel Guirado, Violeta Pina, Jessica Pérez, Andrés Martínez, Jorge Cutillas, Joaquín L. Castillo, Manuel Rodríguez, Sonia Ávila, Andrea Guirado y Joaquín López.

Agradecer también a la empresa ECOSERVICIOS y a OBIMASA por haber colaborado en el rescate de pardelas.

A la Ciudad de Ceuta por financiar a la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta.

RESUMEN RESULTADOS RAM CEUTA 2025

Este año las jornadas de observación han estado condicionadas una vez más por las inclemencias meteorológicas. Mucha niebla durante los meses de verano, lluvia en otras ocasiones e incluso una alerta naranja en el mes de diciembre.

Estos imprevistos y otros acontecimientos ya habituales que coinciden en fecha con las jornadas (equipamiento con GPS a gaviotas de Audouin, celebración del día de las aves, participación en las jornadas ornitológicas del Jbel Moussa y el Trail la Cuna de la Legión), han obligado a modificar el día de realización de varias de ellas y anular la de agosto por la niebla, a pesar de que lo intentamos en dos semanas diferentes.

Esta temporada se han censado 15.667 aves. Como es habitual, el mayor número de ejemplares se da en noviembre con 4.021 aves/hora, pero este año aparece por primera vez en segundo lugar junio con 592 aves/hora, pese a haber sido una jornada con una espesa niebla que limitó mucho el campo de visibilidad, el mejor dato de la serie histórica para este mes. En la parte negativa, octubre ha tenido el registro más bajo de la serie para ese mes con sólo 30 aves/hora.

En cuanto a número de especies observadas, recuperan el protagonismo los meses de invierno. Destaca diciembre con 16 especies diferentes, seguido por enero con 13 y febrero con 11.

La especie más numerosa, como es habitual, es la **pardela cenicienta (*Calonectris diomedea*)**, con 14.067 ejemplares. Los máximos conteos se obtuvieron en noviembre con 3.966 aves/hora y en junio con 451 aves/hora. Este año no se han observado ejemplares en enero.

De **alcatraz atlántico (*Morus bassanus*)** se han observado 362 ejemplares, aunque se mantiene por debajo de la media en 8 de los 11 meses censados. Los máximos se dieron en noviembre con 49 aves/hora y diciembre con 25 aves/hora. Aunque son conteos de pocos ejemplares, los meses de mayo y junio fueron los mejores de la serie histórica, con 3,6 y 5,8 aves/hora respectivamente.



La **pardela balear (*Puffinus mauretanicus*)**, remonta sobre los mínimos de 2024 con un total de 156 ejemplares. Los conteos máximos fueron en junio con 40 aves/hora y febrero con 18 aves/hora, que fueron los únicos meses por encima de la media de la serie histórica.

En cuanto al **charrán patinegro (*Thalas-seus sandwicensis*)**, se mantiene en la tendencia de mínimos establecida en los últimos tres años, con 150 ejemplares. Los conteos máximos fueron en marzo y abril con 13 y 14 aves/hora respectivamente. Sólo en esos dos meses se supera la media de la serie histórica.



Pero sin duda la especie invernante cuyo descenso es más acusado es la **gaviota reidora (*Chroicrocephalus ridibundus*)**. Aunque sus números crecen ligeramente sobre 2024, sigue por debajo de la media todos los meses del año. Sólo se han registrado 63 ejemplares, la mayoría se concentraron en enero y febrero con 10 y 12,4 aves/hora respectivamente. El resto del año su presencia es testimonial.

Sin embargo, una especie que ha consolidado su presencia en todas las jornadas es la **gaviota de Audouin (*Ichthyaetus audouinii*)**, que ha pasado de ser un ave escasa en Ceuta a principios de siglo XXI, a ser común durante la reproducción y los periodos migratorios e invernante escasa, pudiéndose ver en Ceuta durante todos los meses del año. En números absolutos ha sido la tercera especie más observada, con 339 ejemplares, y máximos en junio con 210, correspondientes al mayor número de ejemplares presentes sobre el terreno en la colonia durante la realización de la jornada, sin tener en cuenta la entrada y salida de individuos porque se podrían contar más de una vez.

En cuanto a las otras especies, este año mejora la situación tanto en número de ejemplares como en especies sobre 2024. Aumentan las gaviotas, a las habituales, Audouin, reidora, cabecinegra y sombría se añaden 1 cana y 1 tridáctila en el mes de diciembre. También hay más limícolas: vuelvepiedras, zarapito trinador, andarríos chico, chorlito grande y ostrero euroasiático. Buena jornada en diciembre con paso de 115 álcidos/hora, aunque sin poder identificar la especie por la lejanía de las observaciones. Se mantiene un pequeño número de cormoranes, los escasos págalo grande y parásito, y este año se vuelve a ver después de mucho tiempo un negrón común.

En total han sido 23 especies observadas, en las que se incluyen dos aves acuáticas que se ven habitualmente en nuestras costas, la garceta común y la garza real, y una pardela no identificada (posible pichoneta-mediterránea).

El detalle de las observaciones por meses y especies se puede observar en la tabla nº1

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Nº HORAS	3	3	3	3	2,5	2,25	2,0	0,0	3	3	3	3
Pardela cenicienta	-	343	573	31	27	1015	84	-	58	38	11897	1
Pardela balear	1	46	-	1	1	91	1	-	-	6	4	5
Pardela sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Alcatraz atlántico	11	34	24	41	9	13	1		1	6	146	76
Charrán patinegro	23	16	40	42	-	-	-	-	-	1	9	19
Gaviota reidora	30	31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Vuelvepiedras	5	-	-	-	8	-	-	-	19	14	-	17
Cormorán grande	3	18	2	3	-	-	-	-	-	3	3	-
Págalo grande	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Págalo parásito	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Nº HORAS	3	3	3	3	2,5	2,25	2,0	0,0	3	3	3	3
Págalo sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Gaviota cabecinegra	26	6	-	3	-	-	-	-	-	15	1	4
Gaviota sombría	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Gaviota Audouin	2	1	10	4	4	210	98	-	3	5	-	2
Gaviota cana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Gaviota tridáctila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Negrón común	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Zarapito trinador	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
Garceta común	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
Álcido sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
Alca común	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostrero euroasiático	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Andarrios chico	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Garza real	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chorlito grande	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

Tabla nº1: Observaciones por meses y especies.

AGRADECIMIENTOS

Este año el proyecto han participado en las jornadas de observación los siguientes voluntarios:

Alejandro Sanz, Hanan Salah, Joaquín López Castillo, Salomé Quiroga, Almoraima Ocaña, José Navarrete, Cecilio Castillo, Blanca Valero, Félix Fernández, Lucía Martín, Concha Bernet, Andrea Guirado, Fran Serrano, Julia Rionda, Rocío Gómez, José Manuel Pérez, Miguel Ángel Guirado y Joaquín López Rodríguez. Además, nos han acompañado unos 20 simpatizantes que vinieron a disfrutar de las jornadas de observación durante todo el año.

Resultados anillamento Gaviota de Audouin (*Ichthyaeetus audouinii*) en Ceuta, año 2025



Joaquín López Rodríguez¹ y Miguel Ángel Guirado Cajal¹

¹ Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta

Seguimiento de la colonia

La campaña de 2024 fue muy complicada para la colonia de gaviota de Audouin en Ceuta. Expulsados de su territorio de la playa del Sarchal, encontraron refugio en los acantilados del Hacho. A pesar de ser zona ZEPA, se trata de un lugar muy transitado y las molestias fueron muy importantes. La temporada se saldó con una mortalidad muy elevada de pollos, algo no habitual en la playa del Sarchal, dónde la tasa de supervivencia era superior al 90% de los pollos anillados. En varias inspecciones se localizaron 9 individuos anillados muertos (7 con PVC y dos con metal) y otros 7 no anillados. A pesar de ello, la temporada 2025 ha sido aún más dramática. Se han detectado intrusiones en la colonia de perros, gatos, bañistas, pescadores y personas que hacían botellón. Muchas de estas agresiones han sido grabadas en vídeo, incluso la captura de un ejemplar adulto por un pescador a escasos metros de la colonia.

A todas estas interferencias provocadas de una forma u otra por el ser humano y los animales “domésticos” (perros y gatos), hay que añadir la

presencia de numerosos depredadores naturales: rapaces, culebras, grajillas, garcillas bueyeras y gaviotas patiamarillas residentes en la zona pueden ser la causa de la muerte de pollos recién nacidos, cuya desaparición a los pocos días de la eclosión de los huevos también ha sido documentada con fotos.

Cronología

05/01/2025. Se observan los primeros ejemplares adultos, 1 lectura de anilla de un ejemplar nacido en el Sarchal 2018.

27/02/2025. Se inicia el seguimiento y se observan más de 200 ejemplares en la zona.

02/03/2025. Se inicia el control mediante lectura de anillas con 6 controles de aves locales y 3 ejemplares de otras colonias, una de ellos formó parte de los ejemplares reproductores.

22/03/2025. Se observan unos 400 ejemplares en la colonia.

06/04/2025. Se observan los primeros nidos.

10/05/2025. Jornada de anillamiento de adultos. 11 ejemplares equipados con GPS, 10 nuevos y 1 recaptura.

15/05/2025. Primeros pollos, mueren al día siguiente.

18/05/2025. Nacimiento de nuevos pollos.

24/05/2025. Se confirma la desaparición de pollos nacidos entre el 15 y el 18 de mayo.

28/05/2025. Se observan un mínimo de 20 nidos en el nuevo núcleo de la zona oeste, sin pollos nacidos.

18/06/2025. Varios nidos con pollos recién nacidos en la parte oeste. Parte este con pollos ya volantones.

22/06/2025. Jornada de anillamiento de pollos. 21 ejemplares anillados.

12/07/2025. Se localiza 1 pollo anillado muerto. Proporción de pollos anillados / no anillados en rocas 1/1. Fin del seguimiento.

Se estima una población reproductora de unas 180-190 parejas con un éxito reproductor en torno a 0,2 – 0,25 pollos por pareja.

Se ha confirmado mediante observación con telescopio que la explanada del muelle de Poniente es un punto de reunión muy importante de gaviotas en general durante los flujos migratorios, especialmente con mal tiempo en la prenupcial y al anochecer en la postnupcial. En el caso de las gaviotas de Audouin el máximo contabilizado fue 265 ejemplares el 05/07/2025.

Más información se puede consultar en el blog “*gaviotas y pardelas*”, concretamente en la entrada:

<https://gaviotasypardelas.blogspot.com/2025/08/este-ano-solo-tragedia.html>

Resultados anillamiento

2025 ha sido el décimo año que se han anillado pollos en la colonia y el tercero que se han anillado ejemplares adultos, equipados con dispositivos de localización y seguimiento remoto, en el marco del proyecto SEANIMALMOVE, Monitorización del movimiento y dinámica poblacional de vertebrados marinos y litorales ante los impactos antropogénicos en un escenario de cambio global. Proyecto financiado por las AYUDAS A PROYECTOS I+D+i, EN EL MARCO DEL PLAN COMPLEMENTARIO DE CIENCIAS MARINAS Y DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. CONVOCATORIA 2023.

El anillamiento de adultos se realizó el sábado 10 de mayo y nuestra aportación consistió en el asesoramiento para la localización de lugares adecuados para la captura de las aves, el anillamiento con anillas metálicas y de PVC y la toma de datos biométricos.

En esta ocasión se equiparon 11 ejemplares adultos con GPS, 10 nuevos anillados y una recaptura de 1 ejemplar nacido en la colonia de la playa del Sarchal en 2018.

En cuanto al anillamiento de pollos en nido, se realizó el 22 de junio, marcándose 21 ejemplares con PVC, el segundo año con menos ejemplares anillados después del fatídico 2020. En el conjunto de las campañas se han anillado 360 ejemplares con anillas de PVC.

Lecturas de anillas

El número de ejemplares anillados que se observan en la colonia es cada vez mayor, debido tanto a los pollos anillados que regresan a la misma como a los adultos capturados para ser equipados con dispositivos de seguimiento remoto. Esto significa que cada vez tenemos más información de la composición de los componentes de la misma.

La mayoría de los ejemplares son nacidos o anillados ya de adultos en Ceuta, aunque cada año se incorporan nuevos individuos procedentes de otras colonias. Sin tener en cuenta los individuos anillados en 2025, se han observado en la colonia 77 ejemplares adultos vivos anillados en Ceuta, 2 muertos y 3 inmaduros, mientras que son 9 los individuos adultos anillados en otras colonias observados más de una vez entre los meses de abril a junio. Sin tener en cuenta los ejemplares anillados en colonia como adultos, el 88,5% de los ejemplares anillados proceden de Ceuta.

Fuera de la colonia se han recibido 17 citas de 16 ejemplares, 5 observados en la península Tingitana, 2 en Conil y en Caleta de Vélez, 1 en Marruecos atlántico, Gambia, Algarve, Manilva, Melilla y Barbate y 1 observación invernal en la bahía sur de Ceuta. De estos ejemplares 7 no se han visto en Ceuta este año.

Conclusiones

Las lecturas de anillas recibidas nos están proporcionando una interesante información, que van dando respuesta a los objetivos planteados al inicio del proyecto (López et al, 2019).

1.- En 2025 se mantiene el número de parejas reproductoras con respecto a 2024, debido a que llegan nuevos ejemplares procedentes de las generaciones nacidas en la colonia que sustituyen a las bajas de ejemplares más veteranos.

2.- Un año más se reduce el éxito reproductor, el menor desde que las gaviotas de Audouin se establecieron en Ceuta si exceptuamos 2020.

3.- Continúa la incorporación de ejemplares anillados en otras colonias, procedentes de Melilla y de las salinas de Torre Vieja. A pesar de ello, la colonia sigue nutriéndose principalmente de ejemplares nacidos en Ceuta.

4.- Se ha localizado un nuevo ejemplar adulto asociado a otra colonia reproductora (Melilla). En total ya son 8 los ejemplares adultos observados que no han regresado a Ceuta. También se ha tenido una observación de un ejemplar que no ha vuelto en los últimos dos años a Ceuta.

5.- Cada vez tenemos más datos que confirman la hipótesis de que una parte de los ejemplares nacidos en Ceuta no abandonan el mar Mediterráneo durante los meses de invierno y se quedan a menos de 100 km de la colonia. También se tiene constancia de la presencia de otros ejemplares en el entorno del estrecho de Gibraltar y mar de Alborán. Este año se ha vuelto a tener una observación de un ejemplar joven en Gambia, hasta ahora límite el sur de la zona de invernada.

Agradecimientos

Estos resultados son fruto del trabajo de un equipo sin el cual sería imposible alcanzar los objetivos, especialmente a Manuel Rodríguez, Andrés Martínez, Blanca Valero, Iván Silva, Alejandro Sanz, Hanan Salah, Marichén Sánchez, Salomé Quiroga y Félix Fernández.

A los compañeros de la Universidad de Cádiz, que por tercer año han equipado con dispositivos GPS a ejemplares adultos de la colonia.

A la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Ceuta por financiar a la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta.

A todos los observadores que nos han enviado sus lecturas, sin ellos el proyecto carece de sentido.

RESULTADOS ANILLAMIENTO GAVIOTA PATIAMARILLA (LARUS MICHAHELLIS) EN CEUTA, AÑO 2025

Autores: Joaquín López Rodríguez y Miguel Ángel Guirado Cajal



En 2025 se han anillado 160 ejemplares con anilla de PVC. (Tabla nº1).

EDAD	EJEMPLARES
Pollos anillados en nido	98
Aves en su primer año	49
Aves en su segundo año	2
Aves en su tercer año	2
Aves en su cuarto año	1
Aves adultas	8

Desde 2013, primer año de proyecto, se han anillado 1.651 ejemplares con PVC, de los que, a 31 de diciembre de 2025, se han obtenido **controles de 962 aves (58,3%)**. En la tabla nº2 se muestra la información que tenemos de las aves observadas según la última lectura realizada.

Campaña	Anillados	Obs. Vivos	Obs.Muertos	%
2013	88	59	7	75,00%
2014	128	94	2	75,00%
2015	105	69	5	70,50%
2016	136	80	0	58,80%
2017	126	72	10	65,10%
2018	130	74	5	60,70%
2019	148	78	6	56,50%
2020	134	68	7	56,00%
2021	154	79	7	55,80%
2022	108	57	2	54,60%
2023	118	44	5	41,50%
2024	116	52	7	50,80%
2025	160	65	8	45,60%
TOTAL	1.651	891	71	58,30%

En 2025 se han obtenido controles de 137 aves. Vuelve a bajar el número de ejemplares observados, un 8% menos que el año anterior, que ya fue el de menos observaciones de las últimas campañas. El 78,1% (n=107) fueron ejemplares anillados a partir de 2022. Sólo se han observado 30 ejemplares adultos.

El 85,4% (n=117) de los ejemplares han sido observados sólo en Ceuta, siendo este porcentaje similar a los de años anteriores. Fuera de nuestra ciudad se obtuvieron 32 observaciones de 20 ejemplares. Esta temporada la región donde se han producido más observaciones ha sido Cádiz, seguido de Málaga y Huelva.

En la tabla nº3 se detallan los lugares dónde han sido observados esos ejemplares.

Región	Controles	Aves controladas
Málaga	7	5
Cádiz	8	7
Huelva	6	4
Marruecos Mediterráneo	1	1
Algarve (Pt.)	5	2
Región Lisboa (Pt.)	4	3
Oporto Norte (Pt.)	1	1
TOTAL	32	20*

**3 ejemplares observados en dos regiones*

Desde el inicio del proyecto y hasta el 31 de diciembre de 2025, el número **total** de **controles fuera de Ceuta** asciende a **472**, pertenecientes a **235 ejemplares**, **24,4%** del total de aves observadas. Se mantiene el porcentaje con respecto al año anterior.

De ellos, se tiene constancia de que al menos el 37% (n=87) regresaron a Ceuta posteriormente. En seis ocasiones hubo un segundo viaje de ida y vuelta (uno a Galicia, otro al Algarve y cuatro a Málaga), mientras que ocho individuos se volvieron a marchar y no se tiene constancia de su vuelta. Por tanto, algo más de un tercio de los ejemplares que se fueron de Ceuta regresaron a su lugar de nacimiento.

Si al 75,6% de ejemplares observados sólo en Ceuta (n=727), se les suman los que han regresado después de su dispersión (n=79), el 83,8% del total de aves observadas han sido vistas por última vez en nuestra ciudad. Estos porcentajes se mantienen estables con respecto al año anterior.

En la tabla nº4 se detallan los lugares donde se han realizado las recuperaciones.

Región	Controles	Aves controladas
Mar del Norte	1	1
Golfo de Vizcaya	1	1
Galicia	12	5
Atlántico portugués	43	30
Atlántico marroquí	6	5
Golfo de Cádiz - Algarve	90	49
Golfo de Cádiz - España	79	39
Sevilla	1	1
Estrecho de Gibraltar	21	16
Península tingitana	12	12
Mar de Alborán norte	201	101
Mar de Alborán sur	9	5
Mar Mediterráneo	2	2
TOTAL	472	235*

**3 ejemplares observados en dos regiones*

CONCLUSIONES

La zona de dispersión preferida de las Gaviotas patiamarillas anilladas en Ceuta es el sur de la península ibérica, entre el Algarve y la provincia de Málaga (75,8% de las aves observadas fuera de Ceuta). Si a estas se les suman las observadas en la costa norte del Marruecos mediterráneo y Melilla, el dato aumenta hasta el 81,7%.

Su distribución es principalmente costera, aunque existe una observación en zona de interior (Veta la Palma, Sevilla), y 44 en vertederos cercanos a la costa, (5 en Casares y 39 en Los Ruices, Málaga), el 9,5% del total de observaciones fuera de Ceuta. Este porcentaje podría variar significativamente si tuviésemos información de lectura de anillas en los vertederos marroquíes cercanos a Ceuta.

Este año hay una lectura en Marruecos, realizada accidentalmente en las calles de Fnideq y no debido a que se haya realizado un esfuerzo de observación. Se evidencia una vez más la escasez de observadores en las provincias vecinas de Tánger y Tetuán, dónde debería ser habitual la presencia de nuestras gaviotas patiamarillas, teniendo en cuenta que, además de extensas playas, existen varios vertederos donde se concentran las gaviotas. Estas lagunas de información sólo podrán ser cubiertas con la colocación de dispositivos GPS a varios ejemplares residentes en nuestra ciudad.

En 2025 el área de dispersión se mantiene dentro de los límites del año anterior.

Océano Atlántico: por el norte Playa de Ares, A Coruña (43°25'N 8°14'W), por el sur, Oued Massa, Marruecos (30°04'N 9°40'W).

Mar Cantábrico: San Vicente de la Barquera (43°23'N 4°23'W).

Mar Mediterráneo: por el sureste Mar Chica, Nador (35°10'N 2°54'W), por el norte Puerto de Barcelona (41°20'N 2°10'E).

Mar del Norte: Nieuw Haamstede, Países Bajos (51°44'N 3°43'E).

La población local sigue sufriendo las consecuencias del síndrome parético, la enfermedad que provoca un importante número de bajas en esta especie. Durante todo el año se han localizado ejemplares afectados en playas.

El núcleo reproductor de los acantilados del Recinto Sur se mantiene en torno a las 100 parejas. No disponemos de datos para conocer cuál es el número de ejemplares que se reproducen en el casco urbano, para ello sería necesario contar con apoyo de la administración y de la empresa encargada de la retirada de nidos de las viviendas. Consideramos que es importante conocer el tamaño real de la población de gaviota patiamarilla para poder valorar su evolución en un futuro.

AGRADECIMIENTOS

A todos los compañeros que han participado en las jornadas de anillamiento: Manuel Rodríguez, Andrés Martínez, Marichén Navas, Mila Martínez, Alejandro Sanz, Blanca Valero, Joaquín L. Castillo y Juan José Rosales.

A todos los que participan en las lecturas de anillas y nos transmiten la información, sin ellos no podría llevarse a cabo el proyecto.

A la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos por financiar a la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta.

NOTICIARIO ORNITOLÓGICO



NOTICIARIO ORNITOLÓGICO

Recopilación efectuada por José Navarrete Pérez.

Publicación de citas relevantes de aves, de acuerdo con los criterios siguientes:

- (P) Primeras citas de una especie para la ciudad.
- (S) Que supongan un cambio de *status* de la especie.
- (R) Todas las citas de especies raras o poco habituales.
- (N) En especies comunes, citas que supongan un número de aves superior a lo habitual.
- (F) En especies comunes, citas en fechas poco habituales.

Los criterios, pormenorizados por especies, se pueden consultar en el siguiente enlace:

<https://www.seoceuta.es/criterios-para-publicacion-citas-en-noticiario-ornitologico>

AVES NUEVAS

Tarro blanco (*Tadorna tadorna*)

Se incorpora con el estatus de OCASIONAL

31 de Marzo de 2025, 1 ave en vuelo, punta Blanca (SEO- Ceuta).

Referencias: estival en el norte de Europa, residente en el centro y oeste de este continente (<https://birdsoftheworld.org>). En la península tingitana es invernante escaso (Navarrete J., López J. y El Khamlichi R., 2024. *Aves de la Península Tingitana*, Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta).



Pato colorado (*Netta rufina*)

Se incorpora con el estatus de OCASIONAL

15 de Julio de 2025, 1 hembra, embalse del Renegado (José Navarrete Pérez).

Referencias: estival en el centro de Europa, residente en el sur de Europa y en el norte de África (<https://birdsoftheworld.org>). En la península tingitana es residente escaso, algo más abundante durante los periodos migratorios y la invernada (Navarrete J., López J. y El Khamlichi R., 2024. *Aves de la Península Tingitana*, Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta).

Citas de interés

Ánade friso *Anas strepera*

(R) 23 de noviembre 2025 al 10 de diciembre 2025, 2 aves, embalse del Infierno, 5 aves a partir del **12 de diciembre 2025**, 7 aves el **20 de diciembre 2025**, 1 ave el **25 de diciembre 2025** (SEO-Ceuta).

Ánade azulón *Anas platyrhynchos*

(R) desde el 15 de julio 2025 en adelante, 1 ave, embalse del Infierno (SEO-Ceuta).

(R) 25 de diciembre 2025, 2 aves, embalse del Infierno (Miguel A. Guirado Cajal).

Ánade rabudo nortño *Anas acuta*



© Joaquín López Rodríguez

(R) 2 de diciembre 2025 al 8 de diciembre 2025, 3 aves, embalse del Infierno (SEO-Ceuta).

Negrón común *Melanitta nigra*

(R) 20 de diciembre 2025, 1 ave en vuelo, punta Blanca (Alejandro Sanz Concepción, Miguel A. Guirado Cajal y Joaquín López Rodríguez).

Pardela cenicienta med./atlánt.

Calonectris diomedea diomedea/borealis



© Cecilio Castillo

(F) 7 de junio 2025, de 9:30 a 10:30, 731 aves en vuelo, punta del Desnarigado (SEO-Ceuta).

(N) 2 de noviembre 2025, de 15:30 a 16:30, 5.680/hora aves, punta del Desnarigado (Joaquín López Rodríguez).

(N) 9 de noviembre 2025, de 09:00 a 12:00, 3.965 aves/hora, punta del Desnarigado (SEO-Ceuta).

(F) 25 de noviembre 2025, de 15:15 a 18:00, 3.700 aves/hora, bahía sur (SEO-Ceuta).

(F) 27 de noviembre 2025, de 16:15 a 18:00, 3.300 aves/hora, punta del Desnarigado (SEO-Ceuta).

(F) 8 de diciembre 2025, de 10:15 a 13:15 h., 86 aves en vuelo, bahía norte (SEO-Ceuta).

(F) 20 de diciembre 2025, 1 ave en vuelo, punta Blanca (Alejandro Sanz Concepción, Miguel A. Guirado Cajal y Joaquín López Rodríguez).

Pardela balear
Puffinus mauretanicus

(N) 7 de junio 2025, de 07:30 a 10:30, 40 aves/hora, punta del Desnarigado (SEO Ceuta).

Zampullín común
Tachybaptus ruficollis

(R) desde el 22 de agosto 2025 en adelante, 1 ave, embalse del Infierno (SEO.Ceuta).

Somormujo lavanco
Podiceps cristatus



© Felix Fernández

(R) 14 de octubre 2025, 1 ave exhausta recogida en el muelle de poniente, se libera al día siguiente en el embalse del Infierno (OBIMASA), donde permanece hasta el **26 de octubre 2025** (SEO-Ceuta).

Flamenco común
Phoenicopterus roseus

(R) 29 de marzo 2025, 14 aves en vuelo, Estrecho (Faustino Chamizo Ragel y Sergio Briones Martín eBird.org).

(R) 24 de julio 2025, 5 aves en vuelo, playa de la Rivera (Sonsoles Cubillo Robles).

Cigüeña negra
Ciconia nigra

(N) 30 de abril 2025, 16 aves en vuelo, pista de Mendicuti (Mick Richardson en eBird.org).

(F) 29 de diciembre 2025, 1 ave en vuelo, embalse del Infierno (Miguel Morales López y Ricardo Espejo en eBird.org).

Cigüeña blanca
Ciconia ciconia

(N) 25 de agosto 2025, de 15:40 a 17:50 h., 437 aves en vuelo, sierra Bullones (Joaquín López Rodríguez, Félix Fernández López y Salomé Quiroga Lombardero).

(N) 29 de agosto 2025, de 11:00 a 12:00 h., 300 aves en vuelo, sierra Bullones (Juan Cañadas Baldrés).

Morito común
Plegadis falcinellus

(N) 23 de septiembre 2025, 30 aves en vuelo hacia el norte, embalse del Infierno (José Navarrete Pérez).

Espátula común
Platalea leucorodia

(R) 19 de octubre 2025, 2 aves en vuelo, puerto deportivo (Manuel V. Rodríguez Ríos).

Martinete común
Nycticorax nycticorax

(N) del 23 de octubre 2025 al 27 de octubre 2025, 6 adultos, azud del Infierno (SEO-Ceuta).

Garza imperial
Ardea purpurea

(R) 30 de abril 2025, 1 ave, azud del Infierno (*Mick Richardson en eBird.org*).

Garceta común
Egretta garzetta

(N) 9 de abril 2025, 9 aves, costa Hacho (*Joaquín López Rodríguez*).

(N) 25 de octubre 2025, 10 aves en vuelo, acantilados Recinto Sur (*Manuel Bárcena y Ángela Ruiz Delgado en eBird.org*).

Alcatraz atlántico
Morus bassana

(F) 7 de junio 2025, de 8:15 a 10:30, 13 aves, punta del Desnarigado (*SEO-Ceuta*).

Cormorán moñudo
Gulosus aristotelis

(R) 16 de abril 2025, 1 adulto y 1 juvenil, punta del Desnarigado (*José A. Lapeña Sarrias*).



(R) 19 de abril 2025, 1 cadáver de un juvenil, muerto recientemente, playa de San Amaro (*Oscar García Díaz*).

Águila pescadora
Pandion haliaetus

(R) 21 de marzo 2025, 1 ave en vuelo, Bda. O'donnell (*Alexandre Justo Álvarez*).



© Andrés Martínez Montes

(R) 8 de septiembre 2025, 1 ave en vuelo, Benzú (*Andrés Martínez Montes, Salomé Quiroga Lombardero y Félix Fernández López*).

Abejero europeo
Pernis apivorus

(F) 19 de abril 2025, 1 ave, pista de Mendicuti (*Darío Gijón Martínez y Adrián Colino Barea en eBird.org*).

(F) 20 de abril 2025, 3 aves en vuelo, ayº de Calamocarro (*Darío Gijón Martínez y Adrián Colino Barea en eBird.org*).

(F) 30 de abril 2025, 80 aves en vuelo, paseo de la Marina (*Mick Richardson en eBird.org*).

Buitre moteado
Gyps rueppelli

(R) 4 de diciembre 2025, 1 ave, García Aldabe (*Iman Abdeslam*).

Águila perdicera
Aquila fasciata

(R) 12 de febrero 2025, 1 ave en vuelo, mirador de Benzú (Yeray Seminario y José Mª Ayuela).

Azor euroasiático
Accipiter gentilis

(R) 30 de abril 2025, 1 ave, pista de Mendicuti (Mick Richardson en eBird.org).

(R) 11 de mayo 2025, 1 ave, pista de Mendicuti (Carlos A. Torralvo, Andrés de la Cruz, Miguel A. Mora y José Navarrete).

(R) 31 de agosto 2025, 1 ave en vuelo, mirador de Belliones (SEO-Ceuta).

(R) 7 de octubre 2025, 1 ave, Mendicuti (Manuel Hermosilla, en eBird.org).

(R) 8 de octubre 2025, 1 ave, ayº de Calamocarro (Manuel Hermosilla, en eBird.org).

(R) 26 de octubre 2025, 1 ave en vuelo, bahía sur (Manuel Bárcena y Ángela Ruiz Delgado).

Aguilucho lagunero occidental
Circus aeruginosus

(N) 15 de julio 2025, 3 aves, monte del Renegado (José M. Ramírez Romero).

Aguilucho cenizo
Circus pygargus

(R) 19 de abril 2025, 1 ave en vuelo, playa de Calamocarro (Adrián Colina Barea, en eBird.org).

(R) 9 de septiembre 2025, 1 ave en vuelo, Mendicuti (José Navarrete Pérez).

Milano real
Milvus milvus

(R) 25 de agosto 2025, 1 ave en vuelo, embalse del Renegado (Alejandro Sanz Concepción).

Milano negro
Milvus migrans

(F) 6 de julio 2025, 6 aves en vuelo, monte del Renegado (José M. Ramírez Romero).

Busardo ratonero
Buteo buteo



© Joaquín Sánchez Espinosa

(R) 27 de marzo 2025, 1 ave en vuelo, Punta Blanca (José Navarrete, Salomé Quiroga y Joaquín López).

(R) 19 de noviembre 2025, 1 ave en vuelo, ayº de Calamocarro (Joaquín López Rodríguez y José Navarrete Pérez).

(R) 7 de diciembre 2025, 1 ave, ayº del Infierno (Félix Rodríguez, Salomé Quiroga, Manuel V. Rodríguez y José Navarrete).

Calamoncillo africano*Porphyrio alleni*

(R) 8 de enero 2025, 1 ave exhausta en Bda. Valiño, muere al día siguiente (Verónica Guerrero, Miguel A., Guirado y José Navarrete).

Chotacabras cuellirrojo*Caprimulgus ruficollis*

© José A. Espinosa Golf

(F) 28 de diciembre 2025, 1 ave, playa del Desnarigado (José A. Espinosa Golf).

Focha moruna*Fulica cristata*

(R) 23 de diciembre 2025, 1 ave cae muerta subitamente en la plaza de los Reyes (Cristina Molina).

Ostrero euroasiático*Haematopus ostralegus*

© Joaquín López Rodríguez

(R) 7 de junio 2025, 2 aves, punta del Desnarigado (SEO-Ceuta).

(R) 16 de agosto 2025, 1 ave, playa de Benzú (Joaquín López Rodríguez).

Vuelvepiedras común*Arenaria interpres*

© Joaquín López Rodríguez

(N) 5 de abril 2025, 45 aves, playa de Calamocarro (Antonio J. Cambelo Jiménez).

(N) 3 de diciembre 2025, 47 aves, costa norte (Joaquín López Rodríguez).

Archibebe común*Tringa totanus*

© Salomé Quiroga Lombardero

(R) 1 de septiembre 2025, 1 ave, playa de Benzú (Salomé Quiroga Lombardero).

(R) 8 de septiembre 2025, 1 ave, playa de Benzú (*Salomé Quiroga Lombardero, Félix Fernández López y Andrés Martínez Montes*).

Gaviota tridáctila
Rissa tridactyla

(R) 19 de diciembre 2025, 6 aves, Benzú (*Alexandre Justo Álvarez*).

(R) 20 de diciembre 2025, 1 ave en vuelo, punta Blanca (*Alejandro Sanz Concepción, Miguel A. Guirado Cajal y Joaquín López Rodríguez*).

Gaviota de Audouin
Larus audouinii

(F) 5 de enero 2025, 12 aves, acantilados Recinto Sur (*Miguel A. Guirado Cajal*).

Gaviota cana
Larus canus

(R) 20 de diciembre 2025, 1 ave en vuelo, punta Blanca (*Alejandro Sanz Concepción, Miguel A. Guirado Cajal y Joaquín López Rodríguez*).

Gavión atlántico
Larus marinus

(R) 2 de febrero 2025, 1 ave, polideportivo Díaz Flor (*Alexandre Justo Álvarez*).

Gaviota patiamarilla
Larus michaellis

(N) 25 de julio 2025, 1.247 aves, muelle de poniente (*Miguel A. Guirado Cajal*).

Charrán bengalí
Thalasseus bengalensis

(N) 11 de septiembre 2025, 6 aves, playa del Chorrillo (*Manuel V. Rodríguez Ríos*).

(N) 6 de octubre 2025, 35 aves, costa sur (*Manuel Hermosilla, en eBird.org*).

(N) 9 de octubre 2025, 15 aves en vuelo, bahía sur (*SEO-Ceuta*).

Charrán común
Sterna hirundo



(R) 13 de septiembre 2025, 35 aves en vuelo, Punta Almina (*Manuel V. Rodríguez Ríos*).

(R) 21 de septiembre 2025, 10 aves en vuelo, Punta Almina (*Manuel V. Rodríguez Ríos*).

(R) 9 de octubre 2025, 1 ave en vuelo, bahía sur (*SEO-Ceuta*).

Fumarel común
Chlidonias niger

(R) 30 de agosto 2025, 10 aves en vuelo, punta Almina (*Manuel V. Rodríguez Ríos*).

(R) 7 de septiembre 2025, 23 aves en vuelo, punta Almina (*Manuel V. Rodríguez Ríos*).

(R) 9 de octubre 2025, 1 ave en vuelo, bahía Sur (SEO-Ceuta).

Págalo parásito
Stercorarius parasiticus

(R) 28 de octubre 2025, 1 ave en vuelo, punta del Desnarigado (Joaquín López Rodríguez y Víctor Campello Román).

(R) 5 de abril 2025, 1 ave en vuelo, Punta Blanca (Joaquín López Rodríguez, Miguel Ángel Guirado Cajal y Alejandro Sanz Concepción).

Paloma torcaz
Columba palumbus

(N) 23 de septiembre 2025, 50 aves, embalse del Infierno (José Navarrete Pérez).

Tórtola europea
Streptopelia turtur

(R) 3 de mayo 2025, 1 ave, ayº del Infierno (grupo CHAGRA).

(R) 9 mayo 2025, 1 ave, ayº del Infierno (José Navarrete Pérez).

Cuco común
Cuculus canorus



(R) 19 de abril 2025, 1 ave, pista de Mendicuti (Darío Gijón Martínez y Adrián Colino Barea en eBird.org).

(R) del 3 al 10 de agosto 2025, 1 juvenil, ayº de Calamocarro (Salvador Jaramillo Rodríguez).

Lechuza común
Tyto alba



(R) 7 de diciembre 2025, 1 cadáver reciente, cementerio de Sta. Catalina (Jesús Gaona Morales).

Autillo europeo
Otus scops

(R) 22 de agosto 2025, 1 ave en árbol frente a la catedral (José Mª Cárceles Moreno).

Mochuelo europeo
Athene noctua

(R) septiembre 2025, 1 juvenil recogido en Bda. Príncipe Alfonso, **se libera el 2 de diciembre 2025** tras su recuperación (Miguel Ángel Guirado Cajal).

Carraca europea
Coracias garrulus

(F) 30 de abril 2025, 1 ave, pista de Mendicuti (Mick Richardson en eBird.org).

Martín pescador común
Alcedo atthis



© Felix Fernández

(F) mes de abril 2025, 1 ave, azud del Infierno (SEO-Ceuta).

Pico picapinos
Dendrocopos major mauritanus

(N) 8 de octubre 2025, 5 aves, Sierra Bullones (Manuel Hermosilla, en eBird.org).

Pito real bereber
Picus vaillantii



© Salomé Quiroga Lombardero

(N) 11 de mayo 2025, 3 aves, pista de Mendicuti (Carlos A. Torralvo, Andrés de la Cruz, Miguel A. Mora y José Navarrete).

Halcón de Eleonora
Falco eleonorae

(R) 20 de julio 2025, 1 ave, Ayº. de las Bombas (José Navarrete Pérez).

(R) 1 de octubre 2025, 1 ave, Isabel II (Manuel Bárcena y Ángela Ruiz Delgado en eBird.org).

Halcón borní
Falco biarmacus

(R) 30 de junio 2025, 1 ave, monte Hacho (José A. Lapeña Sarrias).

Oropéndola europea
Oriolus oriolus

(N) 19 de abril 2025, 4 aves, pista de Mendicuti (Darío Gijón Martínez y Adrián Colino Barea en eBird.org).

(N) 11 de mayo 2025, 20 aves en vuelo, Benzú (Juan M. Sánchez Melero).

Arrendajo euroasiático
Garrulus glandarius

Cita atrasada (R) 18 de marzo 2012, nº indeterminado, ayº de Calamocarro (Unai Fuente Gómez en eBird.org).

Urraca sp.
Pica sp.

(R) 18 de marzo 2012, nº indeterminado, ayº de Calamocarro (Unai Fuente Gómez en eBird.org).

Chova piquirroja
Pyrhocorax pyrrhocorax

(R) 27 de febrero 2025: 45 aves en vuelo, Jbel Moussa (Alexandre Justo Álvarez).

Cuervo pío
Corvus albus

(R) 11 de junio 2025: 1 ave, Isabel II (*Félix Fernández López y Salomé Quiroga Lombardero*).

Bulbul naranjero
Pycnonotus barbatus

(N) 19 de noviembre 2025, 24 aves, Ayº de Calamocarro (*José Navarrete Pérez y Joaquín López Rodríguez*).

Golondrina común
Hirundo rustica

(F) 31 de diciembre 2025: 1 ave en vuelo, Bda. El Sarchal (*Antonia Parrado Pérez y José Navarrete Pérez*).

Mosquitero bilistado
Phylloscopus inornatus

(R) 12 de febrero 2025, 1 ave, ayº de Calamocarro (*Yeray Seminario y José Mª Ayuela*).

Mosquitero silbador
Phylloscopus sibilatrix

(R) 24 de abril 2025, 1 ave, capturada para anillamiento, monte Hacho (*grupo CHAGRA*).

Mosquitero papialbo
Phylloscopus bonelli



© Salomé Quiroga Lombardero

(F) 11 de diciembre 2025, 1 ave, capturada para anillamiento, azud del Infierno (*grupo CHAGRA*).

Mosquitero ibérico
Phylloscopus ibericus

(F) 9 de febrero 2025: 1 ave capturada para anillamiento, azud del Infierno (*grupo CHAGRA*).

(F) 16 de febrero 2025: 6 aves capturadas para anillamiento, azud del Infierno (*grupo CHAGRA*).

(F) 17 de febrero 2025: 1 ave, bda. O'donnell (*Alexandre Justo Álvarez*).

(F) 23 de febrero 2025: 1 ave, bda. O'donnell (*Alexandre Justo Álvarez*) y 9 aves capturadas para anillamiento, azud del Infierno (*grupo CHAGRA*).

(F) 25 de febrero 2025: 1 ave, bda. O'donnell (*Alexandre Justo Álvarez*).

Carricero tordal
Acrocephalus arundinaceus



© Salomé Quiroga Lombardero

(R) 3 de mayo 2025, 1 ave capturada para anillamiento, Ayº del Infierno, se vuelve a capturar el **7 de mayo 2025** (*grupo CHAGRA*).

Carricero común
Acrocephalus scirpaceus



© Salomé Quiroga Lombardero

(F) 9 de febrero 2025, 1 ave capturada para anillamiento, azud del Infierno (grupo Chagra).

(F) 20 de junio 2025, 1 ave capturada para anillamiento, azud del Infierno (grupo Chagra).

Zarcero bereber
Iduna opaca

(F) 20 de junio 2025, 1 ave capturada para anillamiento, azud del Infierno (grupo CHAGRA).

Alzacola rojizo
Cercotrichas galactotes

(R) 18 de abril 2025, 1 ave, Ayº de Calamocarro (*Dario Gijón Martínez y Adrián Colino Barea en eBird.org*).

Acentor común
Prunella modularis

(R) 4 de noviembre 2025, 1 ave capturada para anillamiento, monte Hacho (grupo CHAGRA).

Lavandera blanca
Motacilla alba

(F) 18 de junio 2025, 1 ave, parque Juan Carlos I (*José Navarrete Pérez*).

Pinzón real
Fringilla montifringilla

(R) 28 de octubre 2025, 1 ave capturada para anillamiento, monte Hacho (grupo CHAGRA).

Camachuelo carminoso
Carpodacus erythrinus



© José Navarrete Pérez

(R) 11 de noviembre 2025, 1 ave capturada para anillamiento, azud del Infierno (grupo CHAGRA).

Escribano sahariano
Emberiza sahari

(F) 1 de marzo 2025, reproducción precoz, una pareja con dos pollos volanderos, Parques de Ceuta (*Miguel A. Guirado Cajal*).

(N) 9 de octubre 2025, 5 aves, costa Hacho (*Manuel Hermosilla, en eBird.org*).



© Joaquín López Rodríguez

**REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y
DEFENSA DEL MEDIO NATURAL**

DENUNCIA DE LA APARICIÓN DE UNA CABRA ESCAPADA EN LA COLONIA DE GAVIOTA DE AUDOUIN

En enero, durante una visita de inspección a la colonia de gaviota de Audouin de los acantilados del monte Hacho, para comprobar si ya habían retornado algunos ejemplares, se pudo observar como una cabra campaba a sus anchas por el lugar, circunstancia que se constató en visitas posteriores.



La presencia de este caprino suponía un grave problema para la gaviota de Audouin, especie protegida que nidifica en esta ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), ya que podía impedir que las parejas pudieran nidificar adecuadamente en el lugar donde lo habían hecho el año anterior, pues al no sentirse seguras podrían abandonar el lugar.



Por todo ello se informó al SEPRONA y a las consejerías de Sanidad y de Medio Ambiente de Ceuta de la situación provocada por este animal, a fin de que se procediera a su retirada.


A mediados de marzo la cabra continuaba en el mismo sitio, cuando ya una gran cantidad de gaviotas de Audouin merodeaban en los alrededores de la zona y no se atrevían a instalarse, por lo que hubo que volver a reiterar la retirada del animal.

Finalmente el 20 de marzo fue capturada la cabra, con lo que la colonia de gaviota de Audouin quedó libre de esta "inocente e involuntaria" amenaza.

REFORMAS EN LA ESTACIÓN MARÍTIMA - COLONIA DE VENCEJOS

La Autoridad Portuaria de Ceuta tenía proyectado realizar unas obras de restauración en la estación marítima a partir del mes de julio de 2024, donde se asentaba una colonia de vencejos. La realización de estas reformas suponía la desaparición de los espacios donde nidificaban estas aves protegidas. Se actuó a tiempo y SEO/BirdLife fué la encargada de realizar el seguimiento de

la colonia y señalar las medidas a adoptar para compatibilizar la ejecución de las obras con la conservación de la población de vencejos, así como evaluar la eficacia de estas una vez implementadas.



Como primera medida y para facilitar que las parejas nidificantes pudieran finalizar con éxito la reproducción, se optó por retrasar el inicio de las obras hasta primeros de octubre, fechas en que los vencejos abandonan la colonia y se han desplazado a su zona de invernada.

Como medida compensatoria se han instalado 34 cajas nido para vencejos, 24 en un muro y 10 en una verja. Cada caja nido tiene capacidad para 3 nidos, por lo que se han instalado un total de 102 nidos, que a primeros de marzo ya estaban disponibles para ser ocupados en la inminente llegada de los primeros vencejos.

En el seguimiento realizado durante el periodo reproductor de 2025, como era previsible, no se ha observado ninguna ocupación de estas cajas nidos. La media de ocupación se sitúa en 2/3 años, por lo que hay que esperar a próximas temporadas para comprobar la eficacia de las medidas.

NUEVAS INICIATIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DE VENCEJOS

Derribos de Acuartelamientos

Ante la información publicada en prensa local de que los terrenos ocupados por los acuartelamientos Otero, Coronel Fiscer y Fuentes Pila van a ser entregados a la Ciudad Autónoma de Ceuta en diciembre de 2026, se procedió a informar a la Consejería de Medio Ambiente de que en estos acuartelamientos se encuentran importantes colonias reproductoras de vencejos, las cuales quedarán totalmente destruidas en el más que probable derribo de los edificios existentes en estos terrenos, para así poder dejar espacio libre para construir otros nuevos o para darle otros usos.

A su vez se solicitó que el derribo de los edificios se lleve a cabo fuera del periodo de nidificación de los vencejos (desde marzo a primeros de octubre), y que previamente se monitoricen todos los edificios para comprobar el número de nidos que acogen. Esta monitorización debe hacerse durante el periodo reproductor del año 2026.

Se ha solicitado también que antes de proceder a los derribos de los edificios se tomen las medidas compensatorias oportunas, procediendo a la instalación de vencejeras.

Una vez realizados los derribos la probabilidad de que los nuevos edificios estén contruidos para el siguiente periodo reproductor (2027) es nula, lo cual dejaría a los vencejos sin lugares alternativos para nidificar durante bastante tiempo, y eso en el supuesto de que los nuevos edificios se construyan ofreciendo posibilidades de nidificación.

De no adoptarse las medidas solicitadas la población de vencejos de Ceuta, que se ha visto reducida en un 87% desde el año 1996, sufrirá un nuevo revés.

Obras de rehabilitación de fachadas

A lo largo del periodo de reproducción de vencejos del año 2025 se pudo comprobar como en numerosos edificios de la ciudad se estaban realizando obras de rehabilitación de fachadas, con instalación de andamios y redes que en algunos casos, como en el bloque nº 21 de la barriada Zurrón o en la fachada trasera de la delegación de gobierno, estaban impidiendo la entrada de los vencejos a sus nidos.



Estos hechos se pusieron en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente, tras lo cual en ambos edificios se realizaron los retoques oportunos en los andamios para que los vencejos pudieran continuar con la reproducción.

Para evitar en el futuro situaciones como esta, se tramitó una nueva solicitud a la Consejería de Medio Ambiente a fin de que previamente al otorgamiento de autorizaciones de obras de rehabilitación, restauración o reformas de las fachadas de edificios, tanto públicos como privados, se compruebe si estos acogen nidos de vencejos (o golondrinas/aviones) y que en caso positivo, las obras deben realizarse fuera del periodo de cría. Además, si algunas obras debieran de llevarse a cabo imperiosamente durante el periodo reproductivo,

deben de establecerse medidas correctoras para evitar el impacto negativo, como la instalación de cajas nido, de encejeras u otros sistemas alternativos.

Estas mismas medidas deben de adoptarse siempre que las restauraciones y reformas inhabiliten los nidos existentes.

Obras de rehabilitación del Museo del Revellín

De nuevo a través de otra publicación en prensa, tuvimos conocimiento de un proyecto de entretenimiento, reparación y pintado de fachadas del museo del Revellín, en el que *“se pretende evitar el apostamiento de palomas sobre cornisas, frisos y dinteles, así como la anidación de vencejos en los óculos de ventilación...”*.

Por este motivo se tramitó una nueva solicitud a las Consejerías de Medio Ambiente y de Cultura a fin de que se anulara el párrafo por el que se pretende evitar la nidificación de vencejos en los óculos del Museo o en cualquier otro punto donde tradicionalmente vienen anidando vencejos en este edificio, así como que se estudie la posibilidad de cerrar los óculos de manera que se permita la entrada a los vencejos, pero que se impidan la entrada a las palomas (agujeros más estrechos), e incluso que se estudie la posibilidad de colocar cajas-nido para vencejos en el interior de los óculos, de manera que estos puedan seguir reproduciéndose en estas cajas y que a su vez impidan la entrada de palomas.

A raíz de esta petición tuvimos una entrevista con la Directora General de Patrimonio de la Consejería de Cultura y se comprometió a atender los puntos solicitados.

APADRINA UNA CAJA NIDO



Durante el mes de febrero se llevó a cabo una nueva campaña de “*Apadrina una caja nido*”, con promoción a través de redes sociales y medios de comunicación para captar voluntarios que se ofrecieran a fabricarlas y colocarlas en lugares donde posteriormente se pudiera hacer su seguimiento.

El 16 de febrero se organizó en la estación ornitológica de Punta Blanca un taller de fabricación de cajas nidos destinadas a las aves de la ciudad, ya que son éstas las que cada vez encuentran más dificultades para hallar refugio.

El taller tuvo una extraordinaria aceptación y participaron unas 180 personas, desde niños hasta personas mayores, jóvenes, familias y amigos, así

como residentes de centros de menores y profesores de distintos colegios para trasladar lo aprendido a los centros educativos.

Se construyeron 30 cajas nido a partir de palés reciclados para contribuir a una cadena sostenible: se desmonta el palé, se corta y luego se fabrican las cajas nido, adaptadas a las distintas especies a las que van destinadas.

Las cajas se repartieron posteriormente por toda la ciudad, dejando la elección del lugar a los que participaron en su fabricación.

Algunas se colocaron en el campo para facilitar la nidificación de aves silvestres. Otros se instalaron en la ciudad en terrazas, centros escolares, patios y otras zonas controladas, teniendo la precaución de que estuvieran protegidas de depredadores y de otras personas mal intencionadas.

Las aves urbanas están viendo reducidos sus lugares apropiados para nidificar, porque las nuevas construcciones no ofrecen lugares adecuados, y además hay escasez de zonas ajardinadas y árboles en las ciudades.

SOLICITUD DE TRASLADO DE LAS COLONIAS FELINAS UBICADAS EN ZEPA,s

En el mes de octubre se solicitó a la Consejería de Medio Ambiente y a la Consejería de Sanidad que, con el objetivo de anular el impacto negativo que los gatos causan sobre la biodiversidad de las ZEPA,s de Ceuta, todas las colonias de gatos que se encuentran ubicadas en espacios de la Red Natura 2000 fueran reubicadas en otras que se considere oportunas donde el impacto sobre la fauna silvestre sea el mínimo posible, por los siguientes motivos:

1.- La Ciudad Autónoma de Ceuta cuenta con dos ZEPA,s (Zonas de Especial Protección para las Aves) integradas en la Red NATURA 2000.

La ZEPA de Calamocarro-Benzú (ES6310001 - SPA/SCI), con una superficie de 601,82 ha., alberga 95 especies de aves, 9 de mamíferos y 2 de reptiles contempladas en el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y enumeradas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE, a las que hay que añadir 70 especies de aves, 19 de mamíferos y 16 de reptiles consideradas de especial relevancia (MITECO).

La ZEPA de los Acantilados del Monte Hacho (ES0000197 - SPA), con una superficie de 28,5 hectáreas, alberga 72 especies de aves contempladas en el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y enumeradas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE, a las que hay que añadir igualmente 24 especies de aves, 2 de mamíferos y 10 de reptiles consideradas de especial relevancia (MITECO).



Gatos en la entrada del Arroyo de Calamocarro

2.- Esta rica y diversa biodiversidad se ve amenazada por la presencia de gatos (*Felis catus*) en las ZEPA,s.

Lamentablemente, la presencia de gatos es cada vez mayor y la proliferación de nuevas colonias es continua. Hasta 14 colonias hemos conseguido localizar y ubicar en estos terrenos.

El gato doméstico es el animal que más ha contribuido a la

extinción de especies, después del hombre.

Los gatos han extinguido a más vertebrados que ningún otro depredador debido a su cosmopolitismo, a su eficacia como carnívoros, a una enorme capacidad de adaptación que les ha permitido colonizar desde las islas subantárticas a las muy áridas y cálidas cercanas a los trópicos. Pero también a una gran fecundidad que los convierte en una bomba demográfica muy difícil de parar.

Un metaanálisis –basado en 530 artículos, libros e informes científicos que abarcan más de un siglo– ha servido para publicar el primer registro completo de los animales que devoran los gatos domésticos. La lista es larga: 2.084 especies diferentes han sido sus víctimas. La mayoría corresponden a aves (981 especies), seguidas por reptiles (463), mamíferos (431), insectos (119), anfibios (57) y otros grupos taxonómicos (33). Casi 350 de estas especies figuran en diferentes listas rojas de especies en peligro de extinción y varias ya están extintas.

En los estudios se menciona que los gatos matan animales que luego no consumen y que, aunque estén bien alimentados, continúan cazando (Lepczyk, C.A., Fantle-Lepczyk, J.E., Dunham, K.D. et al. *A global synthesis and assessment of free-ranging domestic cat diet*. Nat Commun 14, 7809 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41467-023-42766-6>).

- La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, prohíbe expresamente la reubicación o desplazamiento de gatos comunitarios, a excepción de que, entre otros motivos, suponga un impacto negativo para las condiciones de biodiversidad en los espacios naturales protegidos y en los espacios de la Red Natura 2000 (Artículo 42, apartado b).

La respuesta de la Consejería de Sanidad a dicha solicitud ha sido que la pondría en conocimiento de la Coordinadora del Proyecto CER (Captura, Esterilización y Retorno) de la empresa TRAGSATEC. Esta empresa es

la encargada de la ejecución del “Programa de Gestión y Control Ético de Colonias Felinas” y su Coordinadora veterinaria será la que proceda a valorar la situación de las colonias, el impacto sobre la biodiversidad y a planificar las opciones más adecuadas para el traslado de los gatos, poniéndose en contacto con los alimentadores y gestores que pudieran existir en la zona para planificar la reubicación alternativa.

También informa de que ninguna de estas colonias está autorizada por la ciudad y que el desplazamiento de colonias felinas es un proceso complejo que debe realizarse de forma gradual. La reubicación conlleva un tiempo necesario para asegurar la correcta aclimatación y que se cumpla en todo momento con las normas de bienestar animal, realizándose siempre bajo supervisión veterinaria. El procedimiento se iniciará a la mayor brevedad posible y su desarrollo dependerá del número de colonias y de la cantidad de gatos en cada una de ellas.

Posteriormente, en el mes de diciembre la Consejería de Sanidad, para dar cumplimiento a la Ley 7/2023 de protección animal, aprobó el el Protocolo Marco CER (Captura de gatos, Esterilización y Retorno), una herramienta clave para la gestión integral de las colonias felinas.

Este programa busca mejorar el bienestar animal, reducir la población descontrolada de gatos y mitigar los riesgos para la salud pública y el patrimonio natural. En un plazo de unos ocho años prevé alcanzar un porcentaje de esterilización de entre el 85% y el 90% de cada colonia, y presta especial atención a las zonas ZEPA,s.

El documento reconoce que la mayoría de los puntos de alimentación existentes han sido impuestos por alimentadores no autorizados, lo que ha provocado una querencia poblacional felina sin control ni planificación que conlleva graves riesgos y deficiencias.

Habrà que esperar a los resultados con la esperanza de que sean favorables.

DORMIDERO DE LAVANDERAS BLANCAS DEL PUERTO

La lavandera blanca (*motacilla alba*) es una especie invernante en la ciudad de Ceuta. Se encuentra catalogada «en régimen de protección especial» en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies amenazadas.

Esta especie mantiene un dormitorio histórico en la ciudad que, aunque ha cambiado de ubicación a lo largo de los años, siempre ha estado situado en el puerto. Los censos realizados han variado de entre 2.700 ind. (enero de 2004) y 800 ind. (noviembre de 2023).

Durante el invierno 2024/25 se encontraba en los arbustos de la explanada de embarque. Al ser eliminados estos arbustos para instalación de placas solares, las lavanderas han buscado un nuevo dormitorio en un platanero de sombra de la Avda. Juan de Borbón.

Por todo ello, en noviembre se solicitó a la Autoridad Portuaria de Ceuta que mientras el platanero de sombra sea utilizado por las lavanderas como dormitorio, se evite cualquier tipo de tala o de poda sobre el mismo, hasta que las lavanderas regresen a sus zonas de reproducción, a partir del mes de abril.

“III BELLOTADA”



Por tercer año consecutivo, el 23 de noviembre se convocó a numerosos voluntarios para plantar las bellotas que se habían recogido previamente, contando con una excelente participación. Una vez más, de los casi 100 participantes, más de la mitad fueron niños que pudieron disfrutar de una mañana de campo en contacto con la naturaleza y aprendiendo más sobre nuestros alcornoques, árboles autóctonos de Ceuta, los beneficios que los árboles aportan para el medio ambiente y las técnicas de siembra de las bellotas.

JILGUERO EUROPEO (*Carduelis carduelis*) AVE DEL AÑO 2026

El jilguero europeo, una de las aves más conocidas y queridas de la avifauna peninsular, se impone este año después de que la sociedad y los aficionados a la naturaleza participaran en la elección entre las tres candidatas propuestas: jilguero europeo, alondra común y cormorán moñudo.

El jilguero europeo se proclama Ave del Año como una respuesta de la ciudadanía para dar voz a las aves comunes y defender unos campos y unas ciudades con más biodiversidad. Se convierte así el jilguero europeo en la especie bandera del 2026 representando el apoyo de la sociedad a las aves comunes que va a permitir defender unos campos vivos y unas ciudades verdes y saludables.

Con su llamativo plumaje —con careta roja en la cabeza, alas negras con bandas amarillas y dorso pardo— y su variado canto, el jilguero es fácilmente reconocible y muy apreciado por el público general. Se trata de una especie abundante y de amplia distribución en España, presente en prácticamente todo el territorio —incluidas las islas Canarias y Baleares— y con una población nacional estimada en torno a 14-15 millones de ejemplares.

A pesar de su buena situación poblacional —catalogada como de Preocupación Menor en la Lista Roja Europea de Aves—, el jilguero europeo enfrenta amenazas significativas derivadas de las actividades humanas: la captura ilegal con fines de comercio y tenencia en cautividad, y los efectos del uso excesivo de plaguicidas y herbicidas en los sistemas agrícolas, conllevan pérdidas cuantiosas de individuos cada temporada.

La campaña Ave del Año 2026 pretende visibilizar estas amenazas y poner el foco sobre la importancia de conservar la biodiversidad en los paisajes agrarios, espacios donde el jilguero desarrolla gran parte de su ciclo vital. Como especie representativa de los entornos abiertos y multifuncionales —incluidos olivares, dehesas, pastizales con arbolado y márgenes agrícolas—, su elección aporta una valiosa oportunidad para impulsar un diálogo sobre modelos de agricultura más respetuosos con la naturaleza.

TEMPORADA 2025 DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AVES EN CEUTA

Texto y fotos: Clara Benhamú

Un año más, nos hemos hecho cargo de la recuperación y rehabilitación de aves encontradas y rescatadas en Ceuta por ciudadanos que, a través de redes sociales buscaron información y contactaron con SOS vencejos o directamente con nosotros para buscar ayuda.

*La difícil y abrumadora tarea supuso, durante la temporada comprendida entre el 14 de abril y el 23 de octubre de 2025, la atención de 80 casos de aves de 16 especies diferentes, principalmente, de la especie *Apus pallidus* y mayoritariamente en el estadio de polluelo.*

Con un 72,5% de aves totalmente recuperadas y liberadas con éxito, podemos inferir que la metodología empleada, aunque siempre es mejorable, ha dado buenos resultados. Concretamente, la técnica de rehabilitación de alas luxadas en vencejos ha resultado ser de gran efectividad para la devolución a su hábitat de las aves tratadas.

Se hace evidente la necesidad de proteger las zonas actuales de nidificación de los vencejos y propiciar el establecimiento de colonias nuevas que sustituyan a las que ya se han perdido.

Volvemos a concluir que es urgente la creación de un Centro de recuperación de especies silvestres en el que profesionales cualificados asuman esta importante tarea en Ceuta.

INTRODUCCIÓN

La transformación del paisaje urbano de Ceuta, durante las últimas décadas, ha tenido como consecuencia directa la pérdida de espacios adecuados para la reproducción y alimentación de las aves en esta ciudad. Este hecho se hace especialmente patente en el caso de los vencejos, víctimas de la desaparición de las estructuras arquitectónicas que les proporcionaban los huecos necesarios para establecer sus nidos. Además, el cambio climático, la contaminación lumínica y el ruido contribuyen para crear un panorama muy preocupante para las especies urbanas como *Apus apus*, *Apus pallidus*, *Passer domesticus*, etc.

Esta situación ya ha sido denunciada en repetidas ocasiones por SEO Birdlife, SEOce y otras asociaciones conservacionistas, solicitando ante

las Administraciones competentes la adopción de las medidas preventivas y compensatorias oportunas para frenar el importante declive en las poblaciones de las aves urbanas.

Mientras tanto, nosotros aportamos nuestros conocimientos y nuestro tiempo para atender a las aves adultas que sufren accidentes o caen por agotamiento y a los polluelos que se precipitan de los nidos, víctimas de las elevadas temperaturas y debilitados por deshidratación y desnutrición.

La implementación de una metodología eficiente y la publicación de los resultados obtenidos son los objetivos principales del informe que cada año realizamos con la esperanza de que, en un futuro próximo, se cree en nuestra ciudad un Centro de recuperación de especies silvestres en el que profesionales cualificados se hagan cargo de esta imprescindible tarea.

MATERIALES Y MÉTODOS

- Acomodación de las aves:

<i>Apus pallidus</i> <i>Apus apus</i>	Cajas de rafia sintética, con empapadera y papel absorbente en el fondo y provistas de nidos artesanales de cuerda (<i>Imagen 1</i>). Tamaño variable según el número de vencejos (de 2 a 6 por caja).
<i>Serinus serinus</i> <i>Cyanistes teneriffae</i> <i>Cyanistes caeruleus</i> <i>Passer domesticus</i> <i>Emberiza sahari</i> <i>Sturnus unicolor</i> <i>Luscinia megarhynchos</i> <i>Turdus merula</i> <i>Cuculus canorus</i> <i>Pycnonotus barbatus</i>	Caja de cartón naturalizada, con una cara y techo de malla, fondo de hojas secas y heno, laterales con ramas de lentisco frescas; ramas secas atravesadas a modo de “percha” (<i>Imagen 2</i>).
<i>Larus michahellis</i>	Transportín abierto, libres en un patio de luces.
<i>Streptopelia decaocto</i> <i>Caprimulgus ruficollis</i>	Caja de cartón con fondo absorbente y techo de malla.
<i>Columba livia</i>	Caja de cartón con fondo absorbente y techo de malla y, posteriormente, en palomar abierto.



• Pautas de alimentación:

<i>Apus pallidus</i> <i>Apus apus</i>	70% Larvas de <i>Tenebrio molitor</i> 10% <i>Acheta domesticus</i> 20% Insect replacer gel de Psitacus® Estas proporciones se modificaron para los casos con dificultad para deglutir, hasta constituir el gel el 100% de la dieta.
<i>Serinus serinus</i> <i>Emberiza sahari</i>	Papilla para granívoros, larvas de <i>Tenebrio molitor</i> , mezcla de granos (Imagen 3).
<i>Cyanistes teneriffae</i> <i>Cyanistes caeruleus</i> <i>Cuculus canorus</i> <i>Caprimulgus ruficollis</i> <i>Luscinia megarhynchos</i>	Larvas de <i>Tenebrio molitor</i> , abdómenes de <i>Acheta domestica</i> (Imagen 4).
<i>Passer domesticus</i> <i>Sturnus unicolor</i> <i>Pycnonotus barbatus</i> <i>Turdus merula</i>	Larvas de <i>Tenebrio molitor</i> (alimento primordial de los pollos), pasta de cría para granívoros, mezcla de granos y trozos de frutas.
<i>Larus michahellis</i>	Boquerones, sardinas y otros pescados enteros.
<i>Streptopelia decaocto</i> <i>Columba livia</i>	Papilla y pasta de cría para granívoros. Mezcla de granos para palomas.



IMAGEN 3



IMAGEN 4

• Suplementos

Hemos incorporado en dos de las tomas diarias una mezcla compuesta por 30% de Calfostonic® + 30% de Promotor 43® + 20% de Nekton bio® y 20% de Nekton msa®.

• Tratamientos

Heridas abiertas: Desinfección con clorhexidina y, en los casos necesarios, antibiótico tópico y antiinflamatorio por vía oral.

Para las luxaciones en las alas, se realizó inmovilización uniendo las alas a la altura del tercio inferior mediante tira muy fina de esparadrapo de papel.

Las lesiones en las alas requirieron rehabilitación tras la retirada de los vendajes, con las siguientes pautas generales:



IMAGEN 5

1. Estiramientos mantenidos de forma suave y progresiva durante unos 20 segundos en cada posición. Primero en el plano horizontal (*Imagen 5*), luego, en el plano vertical, hasta los 90° (*Imagen 6*) y, por último, hacia delante por encima de la cabeza (*Imagen 7*).



IMAGEN 6



IMAGEN 7

2. Movilización con intensidad muy controlada e incrementada a medida que las articulaciones van cediendo. 20 o 30 repeticiones en cada posición. Primero delante-detrás (Imagen 8), luego, arriba-abajo (Imagen 9) para terminar con movimientos de rotación (Imagen 10).



IMAGEN 8



IMAGEN 9



IMAGEN 10



IMAGEN 11

3. Masaje en partes inferior y superior del ala y pecho del lado afectado y masaje simétrico en ambos lados (Imagen 11).

Las luxaciones y fracturas no abiertas de las extremidades inferiores, se inmovilizaron mediante entablillado y vendaje cohesivo. (Imagen 12)

Los problemas del plumaje tuvieron diferente abordaje, dependiendo del momento en el que se habían producido y de la pauta de muda de cada especie.



IMAGEN 12

En los gorriones encontramos, cada vez con mayor frecuencia, un primer plumaje muy deficiente, con barbas incapaces de cerrar la pluma y ausencia de pigmentación (*en página siguiente Imágenes 13 y 14*). En esta especie, los volantes mudan el plumaje al final del verano, por lo que decidimos esperar a este momento, cuidando mucho la alimentación y con suplementos ricos en biotina y un entorno suficientemente espacioso para favorecer un emplume

correcto. También añadimos vinagre de manzana bio en el agua de baño en una proporción del 1%.



IMAGEN 13



IMAGEN 14

Los casos de plumaje engrasado (*Imagen 15*) los resolvimos mediante lavados sucesivos con detergente lavavajillas y agua templada.



IMAGEN 15




IMAGEN 16

Las calvas por micosis (*Imagen 16*) se resolvieron limpiando las zonas afectadas con bicarbonato diluido en agua al 10%.

En cuanto a los casos de ausencia de rémiges y timoneras, frecuentes en vencejos, la estancia se prolongó hasta que dichas plumas fueron reemplazadas por plumas nuevas.

Los casos de rotura o desperfectos graves en rémiges y timoneras se abordaron de dos formas: si el animal era joven y había margen de tiempo para su liberación, las plumas defectuosas fueron extraídas y esperamos a que creciesen las nuevas (*Imagen 17*). Pero si se trataba de un adulto (*Imagen 18*) o ya estaba próximo el final de la temporada antes de la migración (caso de los vencejos), se practicaron injertos para sustituir las plumas dañadas por otras sanas procedentes de un donante fallecido. Todos estos procedimientos requirieron atención veterinaria.



RESULTADOS

Considerando que la temporada comienza con la recepción del primer vencejo y concluye con la liberación del último, entre el 14 de abril y el 23 de octubre atendimos un total de 80 casos de aves de 16 especies diferentes. (Tabla 1)

	ESPECIES	EDADES			
		POLLOS	VOLANTONES Y JUVENILES	ADULTOS	TOTAL
1	<i>Apus pallidus</i>	37	8	3	48
2	<i>Serinus serinus</i>	1	0	0	1
3	<i>Cyanistes teneriffae</i>	1	0	0	1
4	<i>Apus apus</i>	0	1	1	2
5	<i>Passer domesticus</i>	5	2	1	8
6	<i>Sturnus unicolor</i>	0	2	0	2
7	<i>Cyanistes caeruleus</i>	4	0	0	4
8	<i>Larus michahellis</i>	4	0	0	4
9	<i>Emberiza sahari</i>	2	0	1	3
10	<i>Pycnonotus barbatus</i> (Imagen 19)	1	0	0	1
11	<i>Streptopelia decaocto</i>	0	1	0	1
12	<i>Luscinia megarhynchos</i>	0	0	1	1
13	<i>Cuculus canorus</i> (Imagen 20)	0	1	0	1
14	<i>Columba livia</i>	0	0	1	1
15	<i>Turdus merula</i>	1	0	0	1
16	<i>Caprimulgus ruficollis</i>	0	0	1	1
TOTALES		56	15	9	80

TABLA 1: ESPECIES Y EDADES DE LAS AVES ATENDIDAS



IMAGEN 20

El 60% de los casos correspondieron a la especie *Apus pallidus*, seguida de lejos por *Passer domesticus*, con un 10% de los casos.

56 casos correspondieron a polluelos, 15 eran volantes o juveniles y 9 ya eran ejemplares adultos. Su distribución para cada especie queda reflejada en la *Tabla 1*.

De las 80 aves atendidas, 58 fueron recuperadas y liberadas, 19 fallecieron por causas diversas y 3 tuvieron que ser eutanasiadas (*Tabla 2*).

	Número de casos	%
Liberado	58	72,5
Falleció	19	23,75
Eutanasia	3	3,75
Total	80	100

TABLA 2: DESENLACE

Más del 62% de los casos correspondieron a vencejos de las especies *Apus pallidus* y *Apus apus*. Entre los vencejos, se observa un claro predominio de *A. pallidus* sobre *A. apus*, ya que éstos únicamente supusieron un 2,5% del total de casos.

Consideramos que los datos recabados para especies que no son del género *Apus* no son significativos, dado su escaso número en relación con el elevado número de vencejos atendidos. Centrándonos en éstos, las principales circunstancias de cada caso quedan reflejadas a continuación (*Tabla 3*):

N°	FECHA DE RECOGIDA	ESPECIE	EDAD	PESO INICIAL (g)	ESTADO	DESENLACE	FECHA DESENLACE	DÍAS DE ESTANCIA
1	14/04	<i>A. pallidus</i>	Adulto	47	Conmoción, ojo cerrado	Liberado	15/04	1
2	03/05	<i>A. pallidus</i>	Adulto	40	Aturdido, luxación grave ala dcha	Liberado	16/06	43
3	22/05	<i>A. pallidus</i>	Adulto	33	Luxación ala	Liberado	01/06	8
4	23/05	<i>A. apus</i>	Adulto	34	Fractura ala. I.Q. Herida sangrante dorso	Eutanasia	10/06	18
5	15/06	<i>A. pallidus</i>	Pollo joven	18	Malformación pico	Liberado	17/07	32
6	16/06	<i>A. pallidus</i>	Pollo	38	Deshidratación, faltan 2 primarias	Liberado	16/07	30
7	16/06	<i>A. pallidus</i>	Pollo	35	Deshidratación	Liberado	07/07	37
8	21/06	<i>A. pallidus</i>	Pollo	21	Fractura pico Necrosis pata Atrofia ala	Eutanasia	21/06	0
9	22/06	<i>A. pallidus</i>	Pollo	19	Hipotermia, deshidratación, luxación ala	Falleció	23/06	1
10	23/06	<i>A. pallidus</i>	Pollo	27	Bueno	Liberado	02/08	40
11	24/06	<i>A. pallidus</i>	Pollo	26	Deshidratación desnutrición	Liberado	17/07	23
12	24/06	<i>A. apus</i>	Juvenil	32	Impregnado de grasa sólida	Liberado	28/06	4
13	26/06	<i>A. pallidus</i>	Pollo	16	Muy deshidratado	Falleció	28/06	2
14	28/06	<i>A. pallidus</i>	Pollo	23	Bueno	Liberado	23/07	25
15	28/06	<i>A. pallidus</i>	Pollo joven	27	Bueno	Liberado	10/08	43
16	30/06	<i>A. pallidus</i>	Pollo	14	Deshidratación desnutrición	Falleció	30/06	0
17	30/06	<i>A. pallidus</i>	Pollo	16	Deshidratación desnutrición	Falleció	02/07	2
18	01/07	<i>A. pallidus</i>	Pollo	45	Faltan 2 primarias	Liberado	17/07	16
19	01/07	<i>A. pallidus</i>	Juvenil	29	Desnutrición	Liberado	07/07	6
20	04/07	<i>A. pallidus</i>	Pollo	21	Deshidratación desnutrición y anemia	Falleció	10/07	6

N°	FECHA DE RECOGIDA	ESPECIE	EDAD	PESO INICIAL (g)	ESTADO	DESENLACE	FECHA DESENLACE	DÍAS DE ESTANCIA
21	07/07	<i>A. pallidus</i>	Pollo	17	Deshidratación desnutrición. Primarias rotas	Liberado	24/08	48
22	07/07	<i>A. pallidus</i>	Pollo	13	Deshidratación desnutrición, alimentación errónea	Falleció	08/07	1
23	09/07	<i>A. pallidus</i>	Juvenil	40	Bueno	Liberado	16/07	7
24	06/08	<i>A. pallidus</i>	Juvenil	27	Torsión plumas alas	Liberado	16/08	10
25	06/08	<i>A. pallidus</i>	Juvenil	28	Luxación ala	Liberado	03/09	28
26	06/08	<i>A. pallidus</i>	Pollo		Sin datos	Liberado	14/08	8
27	06/08	<i>A. pallidus</i>	Pollo	30	Sin datos	Liberado	28/08	22
28	06/08	<i>A. pallidus</i>	Pollo	29	Sin datos	Liberado	28/08	22
29	07/08	<i>A. pallidus</i>	Pollo	18	Desnutrición	Liberado	05/09	29
30	13/08	<i>A. pallidus</i>	Pollo	19	Torsión cuello Alimentación errónea	Eutanasia	22/09	40
31	14/08	<i>A. pallidus</i>	Juvenil	24	Desnutrición, problemas deglución	Falleció	15/08	1
32	16/08	<i>A. pallidus</i>	Juvenil	24	Sin rémiges en un ala y sin primarias en la otra. Fractura distal tibiotarso	Eutanasia	28/08	12
33	21/08	<i>A. pallidus</i>	Pollo joven	24	Bueno	Liberado	16/09	26
34	21/08	<i>A. pallidus</i>	Pollo joven	15	Bueno	Liberado	16/09	26
35	23/08	<i>A. pallidus</i>	Pollo joven	26	Desnutrición	Liberado	26/09	
36	26/08	<i>A. pallidus</i>	Pollo joven	16	Agonizando	Falleció	26/08	0
37	27/08	<i>A. pallidus</i>	Pollo joven	13	Deshidratación y des- nutrición severas	Falleció	30/08	3
38	27/08	<i>A. pallidus</i>	Juvenil	17	Desnutrición severa, debilidad extrema	Liberado	10/09	14

Nº	FECHA DE RECOGIDA	ESPECIE	EDAD	PESO INICIAL (g)	ESTADO	DESENLACE	FECHA DESENLACE	DÍAS DE ESTANCIA
39	27/08	<i>A. pallidus</i>	Pollo	19	Desnutrición severa, debilidad extrema	Liberado	22/09	26
40	28/08	<i>A. pallidus</i>	Pollo	21	Desnutrición severa, debilidad extrema	Liberado	26/09	29
41	29/08	<i>A. pallidus</i>	Pollo	17	Deshidratación y desnutrición severas	Liberado	22/09	24
42	31/08	<i>A. pallidus</i>	Pollo	15	Deshidratación, desnutrición e hipotermia severas	Liberado	01/10	31
43	02/09	<i>A. pallidus</i>	Pollo	17	Deshidratación desnutrición luxación ala	Liberado	09/10	37
44	02/09	<i>A. pallidus</i>	Pollo	16	Deshidratación desnutrición	Liberado	01/10	29
45	02/09	<i>A. pallidus</i>	Pollo joven	24	Bueno	Liberado	03/10	31
46	05/09	<i>A. pallidus</i>	Pollo	15	Deshidratación, desnutrición e hipotermia severas	Falleció	07/10	31
47	06/09	<i>A. pallidus</i>	Pollo	18	Deshidratación, desnutrición e hipotermia severas	Falleció	08/10	2
48	02/10	<i>A. pallidus</i>	Juvenil	37	Hemorragia ocular por colisión	Liberado	09/10	7
49	04/10	<i>A. pallidus</i>	Pollo crecido	17	Desnutrición	Falleció	06/10	2
50	04/10	<i>A. pallidus</i>	Pollo crecido	18	Desnutrición e hipotermia	Liberado	23/10	19


TABLA 3: CASOS DEL GÉNERO APUS

Entre los vencejos, el desenlace, por edades, fue el siguiente: (*Tabla 4*)

	Liberado		Falleció		Eutanasia	
	Nº de casos	%	Nº de casos	%	Nº de casos	%
ADULTOS	3	75	0	0	1	25
JUVENILES	7	77,8	1	11,1	1	11,1
POLLOS	24	64,9	11	29,7	2	5,4

TABLA 4: DESENLACE DE LOS VENCEJOS, POR EDADES

La ubicación de las zonas en las que fueron rescatados los vencejos, tanto polluelos, como adultos y juveniles, queda reflejada en el mapa (*Imagen 21*).



DISCUSIÓN

I. ESPECIES ATENDIDAS Y EDADES

Como en temporadas anteriores (Benhamú, 2022, 2023, 2024, 2025), se observa un claro predominio de los vencejos pálidos sobre el resto de especies

rescatadas (Gráfico 1) y, por otra parte, una mayor abundancia de ejemplares en el estadio de polluelo.

GRÁFICO 1: ESPECIES ATENDIDAS (%)





GRÁFICO 2: EDADES DE LAS AVES ATENDIDAS (%)




En conjunto, un 70% de los casos correspondieron a pollos, mientras que los volantones y juveniles constituyeron el 18,75% y los adultos, el 11,25 (Gráfico 2).

Estos datos concuerdan con la pérdida de las condiciones adecuadas para la reproducción de las aves


y muy en especial, de los vencejos. A éstos, no sólo les afecta la desaparición de oquedades en la que establecer los nidos, sino también las nuevas condiciones que, como consecuencia del cambio climático, elevan las temperaturas que deben soportar los pollos en el interior de los nidos y dificultan el aporte de insectos por los progenitores en las épocas de cría.

II. TASA DE ÉXITO EN LAS RECUPERACIONES

III. El éxito en las recuperaciones ha sido del 72,5%



Para el caso concreto del género Apus, el éxito en las recuperaciones ha sido del 68%, que asciende al 72,3% si no se consideran los casos agonizantes que sobrevivieron minutos o pocas horas después de sernos entregados.



IV. LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE RESCATE DE VENCEJOS

En cuanto a los puntos de rescate de vencejos, se aprecia claramente en la imagen 21 una distribución mayoritaria en el hábitat urbano, como cabría esperar en estas especies. Las dos zonas con mayor número de rescates de polluelos (Parques de Ceuta y zona centro comprendida entre la Manzana del Revellín y la Plaza de Maestranza) se corresponden con lugares habituales de nidificación, destacando la colonia ubicada en el parking del centro comercial de Parques de Ceuta.


También se detecta la presencia de zonas de cría en antiguos edificios de uso militar, como los acuartelamientos de Montesa e Ingenieros.

V. CAUSAS DE LOS RESCATES DE VENCEJOS

Del estado en el que llegaron los diferentes ejemplares de vencejo, podemos deducir las causas que han conducido a la necesidad de ser rescatados y recuperados:

Todos los adultos llegaron al principio de la temporada, afectados por traumatismos cuyas consecuencias fueron conmoción, con inflamación ocular y luxaciones y fracturas en las alas. Es muy probable que estas aves sufrieran colisiones poco después de su vuelo migratorio prenupcial.

Entre los juveniles, 3 casos de desnutrición, 3 casos de traumatismos, 2 con



problemas en el plumaje y sólo uno presentaba un buen estado general. Los casos de desnutrición en estos ejemplares tan jóvenes, sin apenas masa muscular y la quilla muy marcada (*Imagen 22*), podemos suponer que se deben a una deficiente alimentación durante su estancia en el nido que, incluso, podría haber propiciado el abandono del mismo prematuramente. En cuanto a los traumatismos, la causa más probable podría ser una falta de pericia en los primeros vuelos. Afortunadamente, todos estos casos pudieron ser rehabilitados con éxito.

En el caso de los pollos, la caída del nido es la causa evidente, pero ¿qué es lo que provoca el accidente o hace que un polluelo se lance del nido sin ninguna posibilidad de sobrevivir sin

ayuda? Teniendo en cuenta que sólo 6 de los 37 polluelos atendidos presentaban un buen estado general, con un peso adecuado para su edad y sin signos de deshidratación y, suponiendo que el tiempo de supervivencia de estos ejemplares desde que caen del nido hasta que son rescatados es muy escaso, cabe suponer que el estado de desnutrición y/o deshidratación observados en más del 80% de los pollos atendidos se produjo previamente a su caída del nido.

VI. COMPARATIVA CON TEMPORADAS ANTERIORES

	Recepción del primer vencejo adulto	Recepción del primer pollo de vencejo	Número de <i>A. pallidus</i> atendidos	Número de <i>A. apus</i> atendidos
2021	23/04	03/06	66	
2022	28/03	23/06	34	7 (17%)
2023	23/05	29/05	43	5 (10,4%)
2024	30/03	31/05	52	3 (5,5%)
2025	14/04	15/06	48	2 (4%)

De la comparativa con temporadas anteriores (Benhamú, 2022, 2023, 2024 y 2025) no se deduce una tendencia clara en la variación del número total de vencejos rescatados, pero sí se observa una disminución progresiva de la proporción de vencejos comunes.

Tampoco podemos establecer una pauta ni en el calendario de llegada ni en el momento de eclosión de los huevos de la primera puesta.

CONCLUSIONES

De la experiencia durante la temporada de recuperaciones de 2025 y del análisis de los datos y resultados obtenidos, extraemos las siguientes conclusiones:

1. Los vencejos adultos sufren traumatismos al principio de la temporada, probablemente por las condiciones meteorológicas y/o debilitamiento a su llegada tras la migración prenupcial.
2. Los vencejos juveniles con signos de desnutrición podrían haber dejado de ser alimentados prematuramente por sus progenitores debido a diversas causas que es difícil establecer (accidentes, migración postnupcial anticipada, etc).
3. En cuanto a los juveniles que presentan traumatismos, creemos importante señalar que una adecuada rehabilitación puede dar muy buenos resultados.
4. La gran mayoría de los polluelos de vencejo presentaron signos de desnutrición y deshidratación en el momento de su rescate, por lo que podemos concluir que su caída del nido no fue accidental o fortuita, sino que se lanzaron ante la falta de alimento. Sólo un escaso número de los polluelos rescatados cayeron del nido accidentalmente.
5. Es urgente proteger las zonas de nidificación de los vencejos mediante las medidas preventivas y compensatorias que garanticen la reproducción de estas aves en nuestra ciudad, salvaguardando sus lugares habituales de cría y propiciando el establecimiento de colonias nuevas que sustituyan a las que ya se han perdido. Para ello, sería muy recomendable la realización de un censo de colonias y nidos que sirva de base para la vigilancia de los nidos existentes, con especial atención a las obras de restauración de fachadas y cubiertas de edificios y a los casos de demolición o cambios de uso de edificaciones antiguas.
6. La elevada tasa de éxito obtenida demuestra que, con una metodología apropiada, es posible salvar la vida de numerosas aves que, sin la atención recibida no habrían tenido ninguna posibilidad de sobrevivir. Esta responsabilidad no debería continuar en manos de particulares, concluimos que es urgente la creación en la ciudad un Centro de recuperación de especies silvestres en el que profesionales cualificados se hagan cargo de esta imperiosa tarea.

BIBLIOGRAFÍA

Benhamú, C. 2022. Recuperación, rehabilitación y liberación de vencejos y otras aves insectívoras en Ceuta, de abril a Noviembre de 2021. Programa AVIN. *Revista Alcudón*, 19, 96-111.

Benhamú, C. 2023. Recuperación, rehabilitación y liberación de vencejos y otras aves insectívoras en Ceuta, de abril a Noviembre de 2022. Programa AVIN. *Revista Alcudón*, 20. 91-108.

Benhamú, C. 2024. Recuperación y rehabilitación de aves en 2023. *Revista Alcudón*, 21. 109-126.

Benhamú, C. 2025. Temporada 2024 de recuperación y rehabilitación de aves en Ceuta. *Revista Alcudón*, 22. 92-106.



Visita el blog Gaviotas y Pardelas, estarás al día de todo lo relacionado con los estudios y avistamientos de aves marinas en Ceuta y alrededores

Web Aves de Ceuta: 18º año en la red

Autor: Antonio J. Cambelo Jiménez

A finales de 2024 la actualización del software con el que habíamos creado nuestra página, nos obligó al rediseño de la página web, desgraciadamente se perdió el soporte que registraba las visitas a la página, por lo que no ha sido posible publicar en este número las estadísticas correspondientes a 2025. Se ha intentado en la medida de nuestros limitados conocimientos implementar las estadísticas para 2025, pero hasta el momento no ha sido posible.

AVES DE CEUTA
ESTUDIO, CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA AVIFAUNA DE CEUTA Y ÁREA DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR Y PENÍNSULA TINGITANA

SOC. ESTUDIOS ORNITOL. DE CEUTA GRUPO LOCAL SEO/CEUTA GRUPO DE ANILLAMIENTO CHAGRA BLOGS

ANILLAMIENTO Jas de del Infierno 24 de abril, jornada de anillamiento en el Monte Hacho Jornada de anillamiento en la Estación Ornitológica de Punta Blanca del 22 de mayo

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

Artículo **Proteger a la gaviota Audouin: el tránsito por los acantilados del Monte Hacho, prohibido hasta agosto** @SEOCCEUTA 4 DE ABRIL DE 2025

Artículo **45 años sin Félix Rodríguez de la Fuente** @SEOCCEUTA 14 DE MARZO DE 2025

PUBLICACIONES

REVISTA ALCUDÓN Nº 19

REVISTA ALCUDÓN Nº 18

REVISTA ALCUDÓN Nº 17

MONOGRÁFICO 1. PROGRAMA PASER 1998-2017

NUEVA PUBLICACIÓN!!! LIBRO Jornada de anillamiento en la

Ceuta
21°/18°
W 88% 1.5 m/s2 N 84% Deste 26-41 km/h
07:10 21:26 Manguera
Sábado 21°/18°
Domingo 22°/17°
Lunes 23°/18°



VISITA NUESTRA PAGINA

AVES DE CEUTA

www.seoceuta.es


PARA ESTABLECER CONTACTO:
avesceuta@gmail.com

AVES DE CEUTA

ESTUDIO, CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA AVIFAUNA DE CEUTA Y ÁREA DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR Y PENÍNSULA TINGITANA

SOC. ESTUDIOS ORNITOL. DE CEUTA GRUPO LOCAL SEO/CEUTA GRUPO DE ANILLAMIENTO CHAGRA BLOGS

ANILLAMIENTO
Isa de
del Infierno
24 de abril, jornada de anillamiento en el Monte Hacho
Jornada de anillamiento en la Estación Ornitológica de Punta Blanca del 22 de mayo



Proteger a la gaviota Audouin: el tránsito por los acantilados del Monte Hacho, prohibido hasta agosto

@SEOCEUTA · 4 DE ABRIL DE 2025

ÚLTIMOS ARTÍCULOS



Artículo
La falta de regulación amenaza la plena integración de Ceuta en la Red Natura 2000
@SEOCEUTA · 18 DE MARZO DE 2025



Artículo
45 años sin Félix Rodríguez de la Fuente
@SEOCEUTA · 14 DE MARZO DE 2025

PUBLICACIONES



REVISTA ALCEDÓN N° 19



REVISTA ALCEDÓN N° 18



REVISTA ALCEDÓN N° 17



MONOGRAFICO 1. PROGRAMA PASER 1998-2017



Artículo
¡¡¡NUEVA PUBLICACIÓN!!! LIBRO AVES DE LA PENÍNSULA TINGITANA
@SEOCEUTA · 1 DE FEBRERO DE 2025



Artículo
Jornada de anillamiento en la Estación Ornitológica de Punta Blanca del 22 de mayo
@SEOCEUTA · 22 DE MARZO DE 2025

Ceuta

21°/18°

82% 1.3 m/s 84% 2541 m/s

07:10 21:28

Mañana

Sábado	☀	21° / 18°
Domingo	☀	22° / 17°
Lunes	☀	22° / 18°
Martes	☀	22° / 18°

HETEROED

Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Serv. Urbanos
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

